



PROGRAM

DR  P4

Debrecen, Kölcsey Központ
2011. október 20-23.

Debreceni Reumatológiai
Oktatási Program
Szakdolgozói
Tudományos Program

PROGRAM

A szakdolgozói program összefoglaló táblázata

2011. október 21. péntek		
9.00-9.10	Megnyitó, köszöntések	Domjáné Lengyel Irén, Szekanecz Zoltán
9.10- 10.45	Biológiai terápiák gyakorlatiasan	Szekanecz Zoltán, Jeges Gáborné, Margitháziné Szabó Emese, Antalné Juhász Erika, Hirtné Krucsó Márta, Virág Éva, Tófalvi Tímea, Csarnainé Pálosi Rita
10.40-11.00	Kávészünet	
11.05-12.20	Osteoporosis, ahogyan mi látjuk	Decsovné Dóczy Katalin, Magyar Istvánné, Kobzos Erzsébet, Huszár László Csabáné, Palkó Krisztina, Némethné Gyurcsik Zsuzsanna
12.20-12.40	Kávészünet	
12.40-13.30	Balneoterápia a reumatológiában	Dósa Tiborné, Szakács-Szentirmai Borbála, Csirmaz Andrea, Győri Irén
13.30-14.20	Ebédészünet	
14.20-15.55	Klinikai vizsgálatok gyakorlatban	Domján Andrea, Balázs Zsuzsanna Királyháziné Györke Eszter, Guba Ildikó, Pósné Király Gabriella, Nagyné Tóth Éva, Bósze Krisztina, Pöstényi Zsuzsanna
15.55-16.10	Kávészünet	
16.10-17.40	Lágyrészreumatizmusok, alternatív terápiák	Bálint Anita, Jeneiné Barkóczy Erzsébet, Pusztai Attila, Véghné Gurmai Margit, Bedő Borbála, Szabóné Pencz Gyöngyi, Nagyné Károly Anita, Hógye Zsófia
20.00	Vacsora	
2011. október 21. péntek		
9.00 10.50	Tuberculosis	Közös program az orvosi tudományos előadáson
10.50-11.10	Kávészünet	
11.10-12.10	Immun-reumatológia	Ács Mariann, Otterbein Renáta, Ságiné Balaton Boglárka, Kovácsné Szöllősi Gabriella
12.10-12.25	Technikai szünet, tesztlap átvétel	
12.25-12.45	Tesztírás	
12.45	Szakdolgozói tudományos program zárása	

12.45-13.40	Ebédszünet
13.40-15.10	Ízületi vizsgálati tanfolyam I. rész
15.10-15.30	Kávészünet
15.30-17.00	Ízületi vizsgálati tanfolyam II. rész
17.00	A tanfolyam zárása

Tudományos program

2011. október 21. péntek

9.00-9.10 Megnyitó, köszöntések
Domjánné Lengyel Irén,
Szekanecz Zoltán

9.10-10.45 Téma: Biológiai terápiák gyakorlatiasan
Üléseelnökök:

9.10-9.25 Terbéné Szekeres Klára, Domján Andrea
„Egyedül nem megy...”
Szekanecz Zoltán, Debrecen

9.25-9.35 A kommunikáció jelentősége a
biológiai terápiában

Jeges Gáborné, Budapest
9.35-9.45 „Véletlenek pedig vannak” párhuzamos
esetismertetés

Margitháziné Szabó Emese, Kistarcsa
9.45-9.55 A szegedi Reumatológiai Klinika, mint
centrum bemutatása, esetismertetés

Antalné Juhász Erika, Szeged

9.55-10.05 Biológiai terápiás sikertörténet

Hírthné Krucsó Márta, Gyula
10.05-10.15 Minőségibb élet - Biológiai terápia

Virág Éva, Kecskemét
10.15-10.25 Az ön-injekciózás elfogadtatása - a beteg-
oktatás fontossága a biológiai terápiában

Tófalvi Tímea, Budapest
10.25-10.35 Biológiai terápiás lehetőségek juvenilis
rheumatoid arthritisben
Csarnainé Pálosi Rita, Debrecen

10.35-10.45 Megbeszélés

10.45-11.05 Kávészünet

11.05-12.20 Téma: Osteoporosis, hogyan mi látjuk
Üléseelnökök:

Szabóné Pencz Gyöngyi, Bálint Anita
11.05-11.15 „Jobb félni, mint megijedni”

Osteoporosis prevenció napjainkban
Decsovné Dóczi Katalin, Kistarcsa

11.15-11.30 Csontsűrűség mérés jelentősége az
osteoporosis diagnosztikájában

Magyar Istvánné, Kistarcsa
11.30-11.40 Táplálkozási tanácsok osteoporosisban

Kobzos Erzsébet, Debrecen
11.40-11.50 Tudatos életvitel osteoporosisban

Huszár László Csabáné, Kecskemét
11.50-12.00 Reumatikus fájdalmak csillapítása

Palkó Krisztina, Székesfehérvár
12.00-12.10 „Leszakad a derekam”

Némethné Gyurcsik Zsuzsanna, Debrecen

12.10-12.20 Megbeszélés

12.20-12.40 Kávészünet

**12.40-13.30 Téma: Balneoterápia a
reumatológiában**

Üléseelnökök:
Bedő Borbála, Győri Irén

12.40-12.50 Fürdőkezelések reumatológiai
kórképekben a „Zsóban”
Dósa Tiborné, Mezőkövesd

PROGRAM

- 12.50-13.00 Víz alatti vízugármasszázsról röviden - tangentor „alapfokon”
Szakács-Szentirmai Borbála, Kistarcsa
- 13.00-13.10 Súlyfürdő - kinek, mikor, mennyit?
Csirmaz Andrea, Mezőkövesd
- 13.10-13.20 Derékfájás terápiás lehetőségei
Győri Irén, Gyula
- 13.20-13.30 Megbeszélés

13.30-14.20 Ebédszünet

14.20-15.55 **Téma: Klinikai vizsgálatok a gyakorlatban**

- Üléselnökök:
Ivanov Anikó, Pósnáné Király Gabriella
- 14.20-14.35 Amíg a vegyületből gyógyszer lesz... ,
klinikai vizsgálatok miértje
Domján Andrea, Debrecen
- 14.35-14.45 A GCP gyakorlati alkalmazása klinikai
vizsgálatokban
Balázs Zsuzsanna, Budapest
- 14.45-14.55 Minőségbiztosítás klinikai
vizsgálatokban
Királyháziné Györke Eszter, Budapest
- 14.55-15.05 Új kihívás, új feladat: szakdolgozó,
mint study koordinátor
Guba Ildikó, Budapest
- 15.05-15.15 Központi laborok a klinikai
vizsgálatokban
Pósnáné Király Gabriella, Debrecen
- 15.15-15.25 Képpalkotó diagnosztika a reumatológiai
klinikai vizsgálatokban
Nagyné Tóth Éva, Debrecen
- 15.25-15.35 Interaktív hang-válasz rendszerek és
elektronikus CRF alkalmazása klinikai
vizsgálatokban
Bősze Krisztina, Budapest
- 15.35-15.45 A „mindent látó szem”, avagy az
unblinded pharmasist szerepe a klinikai
vizsgálatokban
Pöstényi Zsuzsanna, Debrecen
- 15.45-15.55 Megbeszélés

15.55-16.10 Kávészünet

- 16.10-17.40 Téma: Lágyszövet reumatizmusok,
alternatív terápiák
Üléselnökök:
Decsovne Dóczy Katalin,
Antalné Juhász Erika
- 16.10-16.20 Alagút-szindrómák helye a
reumatológiában
Bálint Anita, Debrecen
- 16.20-16.30 Fibromyalgia szindróma, az
életminőséget nagymértékben rontó
kórkép
Jeneiné Barkóczy Erzsébet, Debrecen
- 16.30-16.40 Rheumatoid arthritises betegek
felmérése „up and go” - teszt
segítségével
Véghné Gurmai Margit, Kistarcsa
- 16.40-16.50 Esetismertetés - komplex fizioterápiás
kezelések reumatológiai osztályon
Pusztai Attila, Kistarcsa
- 16.50-17.00 Bio-elektro-mágneses készülékkel
szerzett tapasztalataink különböző
kórképekben
Bedő Borbála, Debrecen
- 17.00-17.10 Radiosynoviorthesis - egy korszerű
terápia
Szabóné Pencz Gyöngyi, Kecskemét
- 17.10-17.20 McKenzie módszer ismertetése
Nagyné Károly Anita, Debrecen
- 17.20-17.30 Ergoterápia és rheumatoid arthritis,
avagy hogyan könnyíthetők a
mindennapok
Hógye Zsófia, Debrecen
- 17.30-17.40 Megbeszélés, torna

20.00 Vacsora - Hotel Lycium, Étterem

2011. október 22. szombat

- 9.00-10.50 **Téma: Tuberculosis Közös program az orvosi tudományos előadáson, a földszinti előadóteremben.**
Üléselnökök: Szilasi Mária, Surányi Péter
- 9.00-9.20 Fogászati góckérdés
Márton Ildikó, Debrecen

9.20-9.40 A tuberculosus klinikuma
Szilasi Mária, Debrecen
9.40-10.00 Tuberculosis immunszupprimált
betegekben
Csontos Zoltán, Debrecen
10.00-10.20 A tuberculosus diagnosztikája és kezelése
Somoskői Ákos, Budapest
10.20-10.40 Mozgásszervi tuberculosus
Surányi Péter, Debrecen
10.40-10.50 Megbeszélés

10.50-11.10 Kávészünet

11.10-12.10 Téma: Immun-reumatológia

Üléselelnökök: Szabóné Törő Anna,
Ságiné Balaton Boglárka

11.10-11.20 Extracorporalis fotoferezis kezelés
progresszív szisztémás sclerosisban
Ács Mariann, Debrecen

11.20-11.30 Immunhiányos állapotok,
immunglobulin pótlás lehetőségei
Otterbein Renáta, Pécs

11.30-11.40 Autoimmun betegek őssejt-
transzplantációja kapcsán szerzett
ápolási tapasztalatok
Ács Mariann, Debrecen

11.40-11.50 Myositis ápolói szemmel

Ságiné Balaton Boglárka, Pécs

11.50-12.00 Gyógytorna jelentősége a myositises
betegek kezelésében

Kovácsné Szöllősi Gabriella, Debrecen

12.00-12.10 Megbeszélés, torna

12.10-12.25 Technikai szünet - tesztlap átvétel

12.25-12.45 Tesztírás

12.45 A Szakdolgozói tudományos program
zárása

12.45-13.40 Ebédészünet

13.40-15.10 Ízületi Vizsgálati Tanfolyam I. rész

15.10-15.30 Kávészünet

15.30-17.00 Ízületi Vizsgálati Tanfolyam II. rész

17.00 A tanfolyam zárása





TOMBOLA



FŐDÍJ: BTL 4710 SONO PROFESSIONAL

- ◇ 1 csatornás Ultrahangterápia
- ◇ grafikus kijelző
- ◇ ultrahangterápia fej 5 cm²
- ◇ 1/3 MHz működési frekvencia
- ◇ beépített protokollok

TOVÁBBI NYEREMÉNYEK:

- DÍJ:** 1 hónapos ingyenes kipróbálás bármely BTL által forgalmazott fizioterápiás készülékre.
- DÍJ:** Minden tombolán résztvevő játékos 2011. december 31-ig **25%-os kedvezményre** és 12 hónapos részletfizetési lehetőségre jogosult, bármely BTL által forgalmazott fizioterápiás készülék vásárlása esetén.

Leadási határidő és sorsolás: A tombolaszelvények leadása 2011. 10. 22-én este 18 óráig lehetséges a regisztrációs pultnál a BTL logóval ellátott ládába. A nyertesek kisorsolására a kongresszus tartalma alatt 2011. 10. 23-án vasárnap 11 óra 10 perckor az utolsó előadás végén kerül sor, a földszinti előadóteremben a BTL Magyarország Kft. képviselőjének jelenlétében.

A részvétel feltételei: A BTL Magyarország Kft. által szervezett a 2011. évi DROP4 ideje alatt szervezett tombolában kizárólag az vehet részt, aki elfogadja a regisztrációs pultnál kifüggesztett részvételi és játékszabályzatot, a regisztrációs szelvényt pedig maradéktalanul kitölti. A játékszabályzat megfelel a szerencsejáték szervezéséről szóló módosított és kiegészített 1991. évi XXXIV. törvénynek.

A játékszabályzat megtekinthető a regisztrációs pultnál, vagy a **BTL Magyarország Kft.** standjánál.

Mobil:

E-mail:

Név:

Cím:



FIZIOTERÁPIA

BTL MODULÁRIS RENDSZER

A HELYESEN KITÖLTÖTT SZELVÉNYT
A PERFORÁLT RÉSZNÉL TÉPJE LE, ÉS DOBJA BE
A REGISZTRÁCIÓNÁL KIHELYEZETT BTL LADÁBA.

Telefon:

Beosztás és
szakterület:

Munkahely:



ELEKTROTHERÁPIA
+
ULTRAHANG
+
LÉZER
+
MÁGNESTERÁPIA
+
LÖKÉSHULLÁM



KIEMELKEDŐ SZOLGÁLTATÁSAINK:

- ◇ kedvezményes lézertanfolyam
- ◇ uniós pályázati lehetőségek
- ◇ részletfizetési konstrukció
- ◇ márkaszerviz a helyi képviselőtnél
- ◇ ingyenes készülék kiszállítás és betanítás
- ◇ 2 év garancia cserekészülékkel

További információért keresse fel képviselőtűnket:

BTL Magyarország Kft.

1154 Budapest, Pöltenberg Ernő u. 46.

Tel./fax: +36 1/410 1345

www.btlnet.hu • btl@btlnet.hu



A Remicade® indikációs területei:

**Rheumatoid Arthritis
Spondylitis Ankylopoetica
Arthritis Psoriatica
Psoriasis**

**Crohn-betegség
Gyermekkori Crohn-betegség
Colitis Ulcerosa**

Remicade (100 mg infliximab) por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz. Szakorvosi rendelvényhez kötött (Sz), csak a felsorolt javallatok kezelésében jártas szakorvos által alkalmazható gyógyszer. **Javallatok:** 1. Metotrexattal kombinálva javallt olyan aktív rheumatoid arthritises felnőtt betegek tüneteinek csökkentésére és fizikális funkciók javítására, - akiknél a betegségget befolyásoló reumaellenes szerrel (DMARD, beleértve a metotrexattal is) végzett kezelés nem volt eredményes - akiknél a súlyos fókú, aktív és progresszív betegséget korábban nem kezelték metotrexattal vagy más DMARD-dal. 2. Súlyos, aktív spondylitis ankylopoetica kezelésére azoknak a felnőtt betegeknek, akik nem megfelelően reagáltak a hagyományos kezelésre. 3. Aktív és progresszív arthritis psoriatica kezelésére felnőtt betegeknek monoterápiában vagy metotrexattal kombinálva, amennyiben a korábbi DMARD-kezelésre adott reakció nem volt megfelelő. 4. Középsúlyos-súlyos plakk-psoriasis kezelésére azoknak a felnőtt betegeknek, akik nem reagáltak, vagy akiknél ellenjavallt, illetve intolerancia áll fenn más szisztémás kezelésekkel (pl. ciklosporin, metotrexát vagy PUVA) szemben. 5. - Közepes és súlyos fókú, aktív Crohn-betegség kezelésére azoknak a felnőtt betegeknek, akik nem reagáltak a megfelelő mértékű és időtartamú kortikoszteroid és/vagy immunuszuppresszív kezelésre, vagy akiknél intolerancia vagy orvosi ellenjavallt áll fenn a kezeléssel szemben. - Fizutalaképzéssel jár, aktív Crohn-betegség kezelésére azoknak a felnőtt betegeknek, akik nem reagáltak a megfelelő mértékű és időtartamú hagyományos kezelése (beleértve az antibiotikum-terápiát, drenázst és immunuszuppresszív terápiát). 6. Súlyos fókú, aktív Crohn-betegség kezelésére 6 és 17 éves kor közötti gyermekeknél, akik nem reagáltak a hagyományos kezelésre, beleértve a kortikoszteroid, az immunomoduláns és az elsődleges étrendi kezelést, illetve akiknél intolerancia vagy orvosi ellenjavallt áll fenn a kezeléssel szemben. A Remicade-et csak hagyományos immunuszuppresszív kezeléssel kombinálva vizsgálják. 7. Középsúlyos-súlyos aktív colitis ulcerosa kezelésére azoknak a felnőtt betegeknek, akik nem megfelelően reagáltak a hagyományos kezelésre, beleértve a kortikoszteroidokat, a 6-merkaptopurint vagy az azatioprint, vagy akiknél intolerancia vagy orvosi ellenjavallt áll fenn a kezeléssel szemben. **Ellenjavallatok:** Túlerzékenység bármely összetevőre; tuberkulózisos vagy egyéb súlyos fertőzés (pl. szepszis, tályog, opportunista fertőzések); közepes vagy súlyos fókú szívelégtelenség (NYHA III/IV). **Adagolás és alkalmazás** (részletesen ld.: Alkalmazási előírás 4.2): Rheumatoid arthritis (metotrexattal kombinálva) 3 mg/100 mg iv. infúzió 2 órán át, amit 2 és 6 hét múlva, majd aztán 8 hetente további 3 mg/100 mg-os infúziókkal kell kiegészíteni. Ha a reakció nem kielégítő, 8 hetente kb.

1,5 mg/100 mg-onként dózismelés (max. 7,5 mg/100 mg-ig) mérlegelhető. Alternatívaként megfontolható 3 mg/100 mg-os infúziókat. Spondylitis ankylopoetica: 5 mg/100 mg iv. infúzió 2 órán át, amit 2 és 6 hét múlva, majd aztán 6-8 hetente további 5 mg/100 mg-os infúziókkal kell kiegészíteni. Arthritis psoriatica: 5 mg/100 mg iv. infúzió 2 órán át, amit 2 és 6 hét múlva, majd aztán 8 hetente további 5 mg/100 mg-os infúziókkal kell kiegészíteni. Psoriasis: 5 mg/100 mg iv. infúzió 2 órán át, amit 2 és 6 hét múlva, majd aztán 8 hetente további 5 mg/100 mg-os infúziókkal kell kiegészíteni. Felnőttkori Crohn-betegség: 5 mg/100 mg iv. infúzió 2 órán át, amit 2 hét múlva (fizutala esetén 6 hét múlva is) további infúzió követ. Ha a beteg ezután reagál, 8 hetente fenntartó kezelés, ha később a betegség jelei és tünetei kiújulnak, ismételt kezelés adható. Gyermekkori Crohn-betegség (6-17 éves): 5 mg/100 mg iv. infúzió 2 órán át, amit 2 és 6 hét múlva, majd aztán 8 hetente további 5 mg/100 mg-os infúziókkal kell kiegészíteni (adagolási időköz egyénileg módosítható). Colitis ulcerosa: 5 mg/100 mg iv. infúzió 2 órán át, amit 2 és 6 hét múlva, majd aztán 8 hetente további 5 mg/100 mg-os infúziókkal kell kiegészíteni. **Főbb mellékhatások** (a TNF-irafertőzés, szembetegség-szerű reakció, fejfájás, vertigo, szédülés, kipirulás, ahdögigüti fertőzések, sinusitis, dyspnoe, hasi fájdalom, hasmenés, hányinger, dyspepsia, emelkedett májenzimek, (csalán)kiütés, viszketés, hyperhidrosis, bőrszárazság, infúziós reakció, mellkasi fájdalom, fáradtság, látás. A TNF-gátlókkal kezelt betegek fogékonyabbak a súlyos fertőzések iránt, és jelenlegi ismereteink szerint a lymphoma, illetve egyéb malignus betegségek kialakulásának rizikója nem zárható ki. Gyermekgyógyászati Crohn-betegek (REACH vizsgálat): anaemia, vér a székletben, leukopenia, kipirulás, vírusfertőzés, neutropenia, szontörés, bakteriális fertőzés, légúti allergiás reakció. A forgalmazást követő, spontán, súlyos nemkívánatos események között szerepelt a hepatosplenikus T-sejtes lymphoma, az armeneti májenzimemelések, a lupuszertü tünetegyüttes és a pozitív autoantitestek.

Felírás előtt, kérjük, olvassa el a teljes alkalmazási előírás, különös tekintettel a pontos indikációra (4.1), az adagolásra és alkalmazásra (4.2), a figyelmeztetésekre (4.4), az interakcióra (4.5) és a mellékhatásokra (4.8). (17/06/2011 EMEA/H/C/240/II/147)

Ártalmogatósi információk (esetleges változásokat ld. www.oep.hu): Remicade 100 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz (1x) fogyasztói ár: 154 278 Ft; tértési díja (EU 100% támogatás mellett): 300 Ft (tá támogatás: 153 978 Ft).

gyors válasz.

gyors döntés.

1. hét

2. hét

12. hét

RÖVIDÍTETT ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS Cimzia 200 mg oldatos injekció

Minden előretöltött fecskendő 200 mg ceterlizumab pegol tartalmú, egy milliliterben. Oldatos injekció előretöltött fecskendőben.

Terápiás javallatok: A Cimzia metotrexáttal (MTX) a közepesen súlyos, ill. súlyos, aktív felnőttkori rheumatoid arthritis (RA) kezelésére javasolt, amikor a betegségmódosító antireumatikus gyógyszerekre (DMARD-ok), köztük a metotrexátra adott terápiás válasz nem megfelelő. A Cimzia monoterápiaként is alkalmazható metotrexát-intoleranciában vagy akkor, ha a folyamatos metotrexát-kezelés nem bizonyul megfelelőnek. A Cimzia metotrexáttal kombinálva kimutatottan lassítja a röntgennel mérhető ízületi károsodás progresszójának ütemét, és javítja a fizikai funkcióit.

Adagolás és alkalmazás: A kezelést a rheumatoid arthritis diagnosztizálásában és kezelésében jártas szakorvosnak kell végeznie. A Cimzia javasolt kezdő adagja felnőtt betegeknek 400 mg a 0., 2. és 4. héten, amit hetenként adott 200 mg fenntartó adag követ. Ahol ez alkalmazható, a MTX adagolását a Cimzia-kezelés alatt is folytatni kell. Amennyiben a kezelés első 12 hetében nem mutatkoznak pozitív terápiás hatások, a kezelés folytatását alaposan meg kell fontolni. A Cimzia biztonságosságát és hatásosságát gyermekek és 18 év alatti serdülők esetében nem igazolták. Nincsenek rendelkezésre álló adatok. Az előretöltött fecskendő teljes tartalma (1 ml) kizárólag szubkután injekcióként adható be.

Ellenjavallatok: A hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység. Aktív tuberculozis, ill. egyéb súlyos fertőzések, pl. sepsis vagy opportunista fertőzések. Közepesen súlyos vagy súlyos szívelégtelenség (NYHA III/IV).

Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések: A betegeket a kezelés előtt, alatt és után (akár 5 hónapig is) szorosan megfigyelés alatt kell tartani az infekciók jelei és tünetei tekintetében, beleértve a tuberculozist is. A kezelést nem indítható klinikailag jelentős, aktív fertőzésben, amíg az adott fertőzés nem kontrollálható. Új, súlyos fertőzés jeleinkezelésekor a kezelést fel kell függeszteni. Különös körültekintés szükséges, ha a körülményben fertőzések kialakulását elősegítő állapotbetegség vagy immunuszuppresszív gyógyszerek alkalmazása szerepel. Beszámoltak súlyos, néha fatális kimenetelű fertőzések, többek között sepsis és tuberculozis, illetve opportunista fertőzések előfordulásáról is. A kezelés előtt minden beteget ki kell vizsgálni mind az aktív, mind az inaktív tuberculozis fertőzés tekintetében. HBV infekció kockázata esetén ellenőrizni kell, hogy a betegnél jelen vannak-e HBV fertőzésre utaló bizonyítékok. A TNF-antagonista-kezelést igénylő HBV-hordozókat a terápia alatt és után még 5 hónapig szoros megfigyelés alatt kell tartani. HBV reaktiváció kialakulása esetén a Cimzia-kezelést le kell állítani, és hatékony antivirális terápiát kell előírni. A TNF-antagonistákkal kezelt betegeknél nem zárható ki lymphoma, leukoemia vagy egyéb malignitás kialakulának esetleges kockázata. Különtekintés szükséges a kezelés megfontolásakor olyan betegeknél, akiknek kártörténetében malignitás szerepel. Elővigyázatosság szükséges TNF-antagonisták alkalmazásakor COPD-ben szenvedő, ill. az erős dohányzás miatt malignitás fokozott kockázatának kiemelt betegeknél. A kezelést fel kell függeszteni azokról a betegeknél, akiknél pangósos szívelégtelenség új tünetei alakulnak ki vagy

a meglévő tünetek rosszabbodnak. Az igazoltan jelentős hematológiai rendellenességekben szenvedő betegeknél megfontolandó a Cimzia-kezelés leállítása. Amennyiben súlyos túlérzékenységi reakciók következnek be, a kezelést azonnal fel kell függeszteni. A további különleges figyelmeztetéseket és óvintézkedéseket kérjük, olvassa el a teljes alkalmazási előírásban.

Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók: A Cimzia és anakinra vagy abatacept kombinált alkalmazása nem javasolt.

Termékenység, terhesség és szoptatás: A fogamzóképes nőknek a terhesség megelőzése érdekében megfelelő fogamzásgátlást kell alkalmazniuk, és azt a Cimzia utolsó alkalmazását követően még legalább 5 hónapig folytatniuk kell. A Cimzia terhesség alatt nem alkalmazható. A szoptatás folytatását/felfüggesztését vagy a Cimzia kezelés folytatását/felfüggesztését mérlegelni kell.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre: A Cimzia kimentében befolyásolja a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességeket. Szédülés (vertigo, látászavar és kimerültség) bekövetkezhet a kezelést követően.

Nemkívánatos hatások, mellékhatások: A klinikai vizsgálatok során észlelt mellékhatások többsége a fertőzésekkel és a parazitafertőzésekkel, valamint az általános tünetekkel, az alkalmazás helyén fellépő reakciókkal kapcsolatos. További gyakori mellékhatások: vértáplálási- és idegrendszeri tünetek, hipertensio, hepatitis, bőrirritáció, általános tünetek és az alkalmazás helyén fellépő reakciók. Nem gyakran vértáplálási- és idegrendszeri

és nyirokrendszeri rosszindulatú betegségeket (beleértve a lymphomát és a leukoemiát is), újonnan kialakuló vagy súlyosbodó psoriasis jelentettek. Az egyéb (nem gyakori és ritka) mellékhatások tekintetében ld. a részletes alkalmazási előírás.

Tüladagolás: A beteg szoros monitorozása, valamint azonnali, megfelelő tüneti kezelés elindítása szükséges.

Inkompatibilitások: Más gyógyszerekkel nem keverhető.

Felhasználhatósági időtartam: 18 hónap.

Különleges tárolási előírások: Hűtőszekrényben (2 °C – 8 °C) tárolandó. Nem fagyasztható! A fénytől való védelem érdekében az előretöltött fecskendőt tartson a dobozában.

Csomagolás: Egy milliliteres előretöltött fecskendő 200 mg ceterlizumab pegol tartalmú.

Osztályozás: Korlátozott érvényű orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek (Sz).

A készítmény kezelésével kapcsolatos információk: Ez a gyógyszerkészítmény kizárólag egy- és kétkezes használatra alkalmas.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: UCB Pharma SA, Allée de la Recherche 60, B-1070 Bruxelles, Belgium

A forgalomba hozatali engedély száma: EU/1/09/544/001-002.

Alkalmazási előírás jóváhagyásának dátuma: 2011. február 9.

További információért/bővebb tájékoztatásért kérjük, olvassa el a részletes alkalmazási előírást. www.ema.europa.eu; www.egy.hu.

Technikai információk

Jelentkezés

Az előzetes regisztráció és befizetés folyamatosan, 2011. október 9-ig tart.

Október 10-től is lehet jelentkezni, de az már helyszínek minősülő regisztráció, a költségeket kérjük 3 napon belül utalni, csak így tudjuk a rendeléseket fenntartani. A Fórum ideje alatt, a helyszínen készpénzben, vagy kártyával egyenlíthető ki a ki nem egyenlített megrendelések összege és a helyszíni regisztrációk díja is.

Banki utalást, számla megküldése nélkül is indíthat, az alábbi számlaszámokra.

New Congress Hungary Kft.

10403538-35317287-00000000

14100206-11473249-01000006

Amennyiben cégnévre szeretne számlát, azt céges számláról utalja, a megjegyzés rovatban DROP4 reg. +név szerepeljen. Csekken (postai készpénzutalványon) befizetett díjak esetén is, a befizető nevéhez a cégnevet írja, ha szponzora van, és a közlemény rovatba írja be a saját nevét.

Helyszíni reg. díj 2011. október 10-től fizetve

Normál regisztráció
Nyugdíjasok, szakorvosjelöltek, rezidensek
Szakdolgozók, kísérő családtag, céges képviselők
Napi díj

étkezesekkel együtt

76 000 Ft + ÁFA
71 000 Ft + ÁFA
66 000 Ft + ÁFA
40 000 Ft + ÁFA

étkezesek nélkül

42 000 Ft + ÁFA
37 000 Ft + ÁFA
32 000 Ft + ÁFA
28 000 Ft + ÁFA

Étkezések külön rendelve, fizetve

ebéd

3 120 Ft + ÁFA

vacsora

8 000 Ft + ÁFA

Rezidensek figyelem! Október 21-én, péntek du. 2 órás immunológiai blokkon való részvétel kötelező rezidensek részére, s egyben ingyenes.

Ph.D hallgatók részére a teljes programon való részvételért 1 kreditpontot írunk jóvá. (0,04 pont/óra)

Kérjük, az orvosi pecsétszámuk helyességét ellenőrizték a jelentkezés leadása előtt.

Az Interdiszciplináris Fórum helyszíne

Kölcsey Központ, 4026 Debrecen, Hunyadi út 1-3.

A regisztrációs iroda nyitva tartása

2011. október 19. szerda: 16.00-19.00
2011. október 20. csütörtök: 8.00-18.00
2011. október 21. péntek: 8.00-18.00
2011. október 22. szombat: 8.00-17.30
2011. október 23. vasárnap: 8.00-16.00

Szolgáltatások

tanfolyami regisztráció, számlakészítés, szállás- és étkezések helyszíni bejelentése, illetve jegyek átvétele, szállás regisztráció. Regisztrációt étkezesekkel és étkezés nélkül is lehet rendelni.

Az étkezéssel regisztráció 4 ebédet, és 3 vacsorát tartalmaz. Svédasztalos étkezések a Fórum helyszínén. A számlán az étkezések összegét feltüntetjük.

Az étkezés nélküli regisztrációs díjak is tartalmaznak közvetített szolgáltatást, a kávészüneteket, ahol igény szerint eszpresszó / cappuccino / gyümölcslé / szénsavas üdítő / ásványvíz és sütemények, szendvicsek fogyaszthatók.

Regisztrációs irodába való érkezéskor, arcképes igazolvány bemutatásával veheti át a kongresszusi anyagot - táskát, kitzűz, jegyzetfüzet, programfüzet.

Csak teljesen kiegyenlített szolgáltatásokat lehet igénybe venni.

Kérjük, hogy szponzoruknál érdeklődjenek időben, hogy a regisztrációjuk, szállásuk 100%-ban rendezett legyen október 9-ig.

Aki a rendezvény előtti napokban fizeti / utalja a részvételi díját, kérjük, hozza magával a befizetési csekket / utalási bizonylatot, a félreértések elkerülése végett. Köszönjük!

A Fórum területén vonalkódos beléptetési rendszer működik. A belépéskor aláírás nélkül, automatikusan elektronikusan jegyezzük a jelenlétét. Kérjük a kitzűzőjüket minden rendezvényi helyszínen használni, ezzel igazolják a szolgáltatásokra való jogosultságukat.

PROGRAM

Olyan kítűzöt kapnak a résztvevők, amihez az általa megrendelt szolgáltatásokat hozzá rendeltük, jegyek nélkül vehetik igénybe azokat. Így az étkezéseket (ebéd, vacsora) a Lycium Étterembe, konferenciaterembe, kiállítótérbe való belépés jogosultságát ezzel tudjuk biztosítani. A Tanfolyamra való regisztráció ideje minimális, valamint a reggeli-esti jelenléti ív aláírásokat teljesen megszűnnek a vonalkódos kítűző használatával. A kávészünetekre továbbra is jegyet kapnak a résztvevők, ezt igény szerint válthatják be a DROP Kávézókbán. Amennyiben kítűzőjét elveszíti, arcképes igazolvány ismételt bemutatása ellenében, kiállítunk egy újat. Ezúton is köszönjük a segítségüket a rendszer használatában!

A DROP4 tanfolyam akkreditálása az alábbi szakképesítésekhez számolható el: A reumatológiai, reumatológiai és fizioterápiás, fizioterápia szakképesítéssel rendelkezők részére kötelező szinten tartó tanfolyam: 50 kreditpontról adunk igazolást, teszttírás kötelező.

A társszakmák képviselői részére: audiológia, belgyógyászat, csecsemő és gyermek fül-orr-gege gyógyászat, diabetológus, fertőző betegségek, fizioterápia, háziorvostan, fogászat, klinikai immunológia és allergológia, infektológia, nephrológia, urológia, tüdőgyógyász, reumatológia, reumatológia-fizioterápia, szakképesítéssel rendelkezők részére kötelezően választható tanfolyam: 50 kreditpontról adunk igazolást, teszttírás kötelező.

Biztosítás és egyéb tudnivalók: Biztosítás és kárrendezés: a rendezvény díjai nem tartalmaznak poggyász-

és felelősségbiztosítást. Kérjük, értékeikre vigyázzanak, mert nem áll módunkban elhagyott értéktárgyaikért ellenértéket fizetni. A kiállítói területet biztonsági szolgálat ellenőrzi, az előadóteremben csak regisztrált résztvevők tartózkodhatnak.

Taxi: A kítűző felmutatásával és a DROP rendezvényre való hivatkozással, kedvezményesen lehet igénybe venni a Főnix Taxi szolgáltatásait. (4. díjtartifa). Telefon: 52/444-444, 24 órás taxi szolgálat. Bejelentkezéskor is kérjük jelezni, hogy DROP résztvevő kér szállítást.

Büfé: A kávé / üdítőjegyet a DROP Kávézóban, illetve a földszinti kávézóban, és a Lycium Hotel Drinkbárjában válthatja be. Egy jegyért választhat eszpresszót, vagy krémkávét, vagy teát, 2dl gyümölcslevet vagy kisüveg szénsavas üdítőt. Ave ásványvizet jegy nélkül fogyaszthat igénye szerint a Fórum teljes ideje alatt.

Főszerző, szakmai információ: Prof. Dr. Szekanecz Zoltán DEOEC Belgyógyászati Intézet Reumatológiai Tanszék (E-mail: szekanecz.zoltan@med.unideb.hu)

A Fórum teljes körű technikai kivitelezője: New Congress Hungary KFT. A szervező: Csonkáné Cibolya Éva Szervező Iroda 3014 Hort, Határ út 18. Levelezési cím: 3014 Hort, Pf.:18. Tel./fax: +36 37 378 539 (üzemeltető), Mobil: +36 20 227 7106 E-mail: nch@newcongress.hu info@newcongress.hu Honlap: www.newcongress.hu

Kiemelt támogatók



Támogatók és kiállítók

Alcon Hungária Kft.
Berner Medicintechnika Kft.
BTL Magyarország Kft.

BSA Pharma Kft.
GlaxoSmithKline Kft.
Körös-Net Kft.
MSD Pharma Hungary Kft.

Medis-Hungary Kft.
Novartis Hungária Kft.
Pfizer Kft.
Richter Gedeon Nyrt.

Roche Magyarország Kft.
Sandoz Hungária Kft.
Teva Magyarország Kft.
UCB Magyarország Kft.

Köszönjük a kiállítók és támogatók aktív részvételét a Fórumon!

Az első és egyetlen IL-6 receptorra ható törzskönyvezett kezelés rheumatoid arthritisben¹

VÁLTOZTASSA MEG AGRESSZÍV RA-BAN szenvető betegek életét




RoACTEMRA[®]
tocilizumab



Roche (Magyarország) Kft.
H-2040 Budaörs, Edison u. 1.
Tel.: 06-23-446-800 Fax: 06-23-446-860
E-mail: info@roche.hu • Web: www.roche.hu

RoActemra 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz.

Minőségi és mennyiségi összetétel: A koncentrátum 20 mg tocilizumabot tartalmaz milliliterenként. A tocilizumab rekombináns DNS-technológiával előállított humanizált, IgG1 monoklonális antitest, humán interleukin-6 (IL-6) receptor antagonistá. 80 mg tocilizumab 4 ml-ben, 200 mg 10 ml-ben, 400 mg 20 ml-ben injekciós üvegeként. **Gyógyszerforma:** koncentrátum oldatos infúzióhoz. **Terápiás javallatok:** A RoActemra metotrexáttal (MTX) kombinálva közepesen súlyos vagy súlyos, aktív rheumatoid arthritis kezelésére javasolt olyan felnőtt betegek esetében, akik nem reagáltak megfelelő módon vagy intoleranciát mutattak más, előzőleg alkalmazott, egy vagy több betegségmódosító antirematikus gyógyszerre (DMARD) vagy tumor nekrosis faktor (TNF) antagonistá kezelésére. Ezeknél a betegeknél a RoActemra monoterápiaként is adható metotrexát intolerancia esetén vagy ha a metotrexáttal történő tartós kezelés nem alkalmazható. A RoActemra metotrexáttal kombinációban adva a röntgennel történő mérések alapján az ízületi károsodás progressiója arányának csökkenését és a fizikai funkciók javulását mutatta. A RoActemra olyan 2 éves, vagy annál idősebb, aktív szisztémás juvenilis idiopathiás arthritisben (sJIA) szenvedő betegek kezelésére javasolt, akik nem reagáltak megfelelő módon az előzőleg alkalmazott, nem-szteroid gyulladásgátlókkal és szisztémás kortikoszteroidokkal végzett kezelésre. A RoActemra monoterápiaként (ha metotrexát intolerancia áll fenn vagy a metotrexát-kezelés nem alkalmazható), vagy metotrexáttal kombinálva adható. **Adagolás és alkalmazás módja: RA-s betegek:** A RoActemra javasolt adagja 8 mg/ ttkg 4 hetente, hígítás után 1 óráss intravenás infúzióban. 100 kg-nál nagyobb testtömegű betegeknél 800 mg-os meghaladó infúziókénti dózis nem ajánlott. Laboratóriumi eltérések esetén szükséges dózismódosítások megvalósíthatók a részletes alkalmazási előírásban. **sJIA-s betegek:** A javasolt adagolás kéthetente egyszer 8 mg/kg 30 kg-os vagy annál nagyobb testtömegű betegeknél, ill. kéthetente egyszer 12 mg/kg 30 kg-nál kisebb testtömegű betegeknél. Az adagolást minden egyes alkalommal a beteg testtömege alapján kell kiszámolni. Laboratóriumi eltérések esetén szükséges dózismódosítások megvalósíthatók a részletes alkalmazási előírásban. **Ellenjavallatok:** A készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Aktív, súlyos fertőzések. **Nemkívánatos hatások, mellékhatások:** Felső légúti fertőzések, cellulitis, pneumonia, orális herpes simplex, herpes zoster, conjunctivitis, gastritis, bőrkörítések, fejfájás, szédülés, máj transzaminázok emelkedése, hipertensio, neutropenia, thrombocytopenia, hypercholesterinaemia. **Gyógyszerközös hatások:** A máj CYP450-enzimeinek az IL-6 által gátolt expressziója toclizumab-kezelés hatására felszabaddul a gátás alól, ezért a terápia kezdésekor vagy leállításakor ellenőrizni kell az egyenlően beállított adagolásra, a CYP 450 enzim által metabolizáló gyógyszerek szedő betegeket, mert a terápia hatás fenntartásához dózismelésére lehet szükség. **Figyelmeztetések:** A RoActemra alkalmazása megfontolandó fennálló diverticulitis esetén. Terhes nőknél történő alkalmazásra nincs megfelelő adat. A RoActemra biztonságosságát és hatékonyságát 2 évnél fiatalabb gyermekek esetében nem igazolták. Nincsenek rendelkezésre álló adatok. **Tárolás:** 2-8 °C között **Renfelhetőség:** "I" TB támogatás mértéke: RA indikációban EU100% 26/a - Magyar Közlöny 77. szám 31/2010.(V.13.) EÜM rendelet, http://www.oep.hu/Szakmaioldalak/Gyogyszer/Publikus_Gyogyszerterizs; sJIA indikáció TB támogatás folyamatban. **Fogyasztói ár:** 210 368 Ft/400mg 1x, 105 630 Ft/200mg/1x, 42 788 Ft/80mg/1x EU tkvi szám: EU/1/08/492/001, EU/1/08/492/003, EU/1/08/492/005. **Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását** (2011. augusztus 01.)



- Kölcsey Központ**
 DROP3 Fórum Tudományos helyszíne
 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
- 1** Hotel Divinus ****
 4032 Debrecen, Nagyerdei crt. 1.
 - 2** Best Western Hotel Kálvin ***
 4026 Debrecen, Kálvin tér 4.
 - 3** Aquaticum Debrecen
 Termál & Welnes Hotel ****
 4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.
 - 4** Hotel Lycium ****
 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
 - 5** Villa Hotel ****
 4032 Debrecen, Medgyessy sétány 4.
 - 6** Hunguest Hotel Nagyerdő ***
 4032 Debrecen, Pallagi út 5.
 - 7** Hotel Platán ****
 4030 Debrecen, Somlyai u. 10.
 - 8** Hotel Óbester****
 4026 Debrecen, Péterfia u. 49.