



DROP9

PROGRAM

**Debreceni Reumatológiai
Oktatási Program**

**Interdiszciplináris
Fórum**

Reumatológiai és határterületi
diagnosztika és terápia

2022. május 17-19.

Debrecen, Kőlcsey Központ



FINANSZÍROZOTTAN ELÉRHETŐ⁷

MÚLJA FÖLÜL A VÁRAKOZÁSOKAT!

**ELJÖTT AZ ÚJ CÉLOK¹⁻³ ALKALMAZÁSÁNAK IDEJE
A RHEUMATOID ARTHRITIS TERÁPIÁJÁBAN**

Methotrexat háttérterápia mellett a RINVOQ-kal
szignifikánsan több beteg ért el remissziót a vizsgálat
12. hetére, mint adalimumabbal⁴⁻⁶

Irodalom:

1. Smolen JS és mtsai, Ann Rheum Dis 2017; 76(6):960-977.
2. Poór Gy, Magyar Reumatológia 2017; 58:68-82.
3. Smolen JS és mtsai, Ann Rheum Dis 2020; 79(6):685-699.
4. Fleischmann R és mtsai, Arthritis Rheumatol. 2019;71(11):1788-1800.
5. Fleischmann R és mtsai, Ann Rheum Dis. 2019; 78(11):1454-1462.
6. Rinvoq alkalmazási előírás, 2021.12.17.
7. 9/1993. (IV.2.) NM rendelet 2022. március 18-án hatályos változata

▽ Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.

Rinvoq 15 mg retard tabletta (upadacitinib)

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/rinvoq-eparproduct-information_hu.pdf

Forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselője:

AbbVie Kft., 1095 Budapest, Lechner Odón fasor 7. Telefonszám: +36 1 455 8600. www.abbvie.hu

A közfinanszírozás alapjául elfogadott ár: 267 398 Ft (Térítési díj: 0 Ft). Forrás: www.neak.gov.hu.

Az aktuális árak megtalálhatók a www.neak.gov.hu oldalon. A Rinvoq 15 mg 2022. január 1-től tételes finanszírozás keretében érhető el a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet alapján. Finanszírozott indikációs kör: rheumatoid arthritis.



DROP

PROGRAM

**Debreceni Reumatológiai
Oktatási Program**

**Interdiszciplináris
Fórum**

Reumatológiai és határterületi
diagnosztika és terápia

2022. május 17-19.

Debrecen, Kölcsey Központ



Tisztelt Kolléganők és Kollégák!

Immáron 14 éve, hogy a bőrgyógyászokkal és szemészekkel megrendeztük az első DROP interdiszciplináris konferenciát. Ezzel egy Debrecenhez kötődő, de országos, igen sikeres konferenciasorozatot indítottunk el. Az első DROP-ot követte a második a gasztroenterológusokkal, hematológusokkal és onkológusokkal, 2010-ben a harmadik, mely a vascularis immunológiát és reumatológiát tekintette át, 2011-ben a DROP4, melynek a reumatológia és infekciók volt a témája, 2013-ban a DROP5, ahol anyagcsere, endokrin betegségek és pulmonológia volt a téma, 2016-ban a DROP6 a neurológia, pszichiátria és idegsebészet témakörben, 2018-ban a DROP7 az ortopédia, traumatológia, geriátria és sportorvoslás határterületeinek tárgyalásával, végül 2021-ben online a DROP8, melyben a fogászat, szájsebészet, fül-orr-gégészet, gyermekgyógyászat, intenzív terápia, sürgősségi orvoslás, urológia, rehabilitáció és ritka betegségek határterületi vonatkozásait tekintettük át. A DROP konferenciákon általában 45-50 előadás hangzott el, és a résztvevők száma mindig elérte a 300-500-at. Ezzel a DROP az egyik legnagyobb hazai konferenciasorozattá nőtte ki magát. Mindez elsősorban nem a szervezők érdeme, hanem az érdeklődő résztvevőké és az előadóké, akik mindig maximális színvonalon adták át az újabb és újabb ismereteket a hallgatóságnak.

A DROP sorozat kilencedik állomása 2022. március 17-19. között remélhetőleg élő formában a megszokott helyen, a debreceni Kölcsey Központban kerül megrendezésre. A DROP9 fő témái ezúttal a reumatológiai és határterületi diagnosztika és terápia. Ennek keretében lényegében az összes, a reumatológiával és immunológiával határterületet képező diszciplína és kórkép terítékre kerül. A tervezett témák, többek között, a reumatológiai kórképek általános epidemiológiája és patogenezise különös tekintettel a terápiás célpontokra, a laboratóriumi, molekuláris, szövettani és képalkotó diagnosztika újdonságai, az egyes gyógyszercsoportok, a klasszikus reumatológiai kórképek, arthritisek, autoimmun reumatológiai kórképek és határterületi betegségek kezelésének újabb aspektusai. Szó lesz a nem gyógyszeres kezelési eljárásokról (fizioterápia, balneoterápia, manuálterápia, sportrehabilitáció, radiosynoviorthesis, pszichoterápia és diéta) is.

Reményeink szerint ismét lesznek esti előadások. Reméljük, végre ismét sikerül személyesen is találkozni és este, kellemes és tartalmas társasági programokon tudjuk majd kipihenni a nap fáradságait. Kérjük, a csütörtökön este védnökeink jelenlétében rendezett ünnepélyes megnyitót se mulasszátok el.

Az előadóknak és üléseknélőknek előre is köszönjük az aktív részvételt. Ez a DROP sem valósulhat meg támogatóink nélkül, nekik is előre köszönjük, hogy ismét mellénk álltak e nagyszabású program szervezése során. Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk Debrecenbe!

Debrecen, 2021. október 9.

Prof. Dr. Szekanecz Zoltán
a kongresszus elnöke



A DROP9 IDŐPONTJA

2022. május 17-19.

A DROP9 HELYSZÍNE

Kölcsey Központ,
4026 Debrecen, Hunyadi út 1-3.

A DROP9 SZERVEZŐI

Debreceni Egyetem ÁOK Reumatológiai Tanszék
Arthritis Alapítvány, Debrecen
Magyar Reumatológusok Egyesülete
Magyar Reumatológusok Egyesülete Észak-Kelet
magyarországi szekciója
Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság
Immunfarmakológiai Szekciója

FŐVÉDNÖK

Dr. Papp László
Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere

A FÓRUM VÉDNÖKEI

Prof. Dr. Szilvássy Zoltán
a Debreceni Egyetem rektora
Prof. Dr. Bács Zoltán
a Debreceni Egyetem kancellárja
Prof. Dr. Mátyus László
a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar dékánja
Prof. Dr. Szabó Zoltán
a Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke

A KONGRESSZUS ELNÖKE

Prof. Dr. Szekanecz Zoltán

FELKÉRT ELŐADÓK

Ábel György (BURLINGTON, MA)	Kardos Zsófia	Pethő Zsófia
Bálint Péter	Kerekes György	Soltész Pál
Balog Attila	Király Márta	Stenová Emőke (POZSONY)
Balogh István	Kiss Emese	Surányi Péter
Bartha Attila	Kovács Attila	Szalayné Kónya
Bély Miklós	Kovács László	Zsuzsa
Bender Tamás	Kumánovics Gábor	Szamosi Szilvia
Boczán Judit	Ladislav Senolt (PRÁGA)	Szántó Antónia
Bodnár Nóra	Lakatos Péter	Szántó Sándor
Bodoki Levente	Mariusz Korkosz (KRAKKÓ)	Szegedi Andrea
Brúgós Boglárka	Mátyus János	Szekanecz Éva
Constantin Tamás	Módis László	Szentesi Margit
Csepány Tünde	Molnár Tamás	Szűcs Gabriella
Czirják László	Müller Gábor	Tarr Tünde
Gaál János	Müller Veronika	Ujvárosy Dóra
Gaál Veronika	Nagy Eszter	Varjú Cecília
Garai Ildikó	Nagy Gábor	Váróczy László
Gáspár Krisztián	Nagy György	Vaskó Attila
Géher Pál	Nagy Katalin	Végh Edit
Gömör Béla	Némethné Gyuresik	Vereckei Edit
Griger Zoltán	Zsuzsanna	Vincze Dávid
Harjit Pal Bhattoa	Papp Mária	Zelmira Macejova (KASSA)
Hodinka László	Péntek Márta	
Káposzta Rita		

A KONGRESSZUS FŐTÉMÁJA

Reumatológiai és határterületi
diagnosztika és terápia

2022. május 17. (kedd)			
09.55-10.00	Köszöntő		
10.00-11.35	STATE-OF-THE-ART ELŐADÁSOK		
11.50-12.50	Ebédszünet		
12.50-13.50	Szimpóziumok		
	NAGYTEREM		BÁLTEREM
12.50-13.20	NOVARTIS szimpózium	12.50-13.20	PFIZER szimpózium
13.20-13.50	SANOFI szimpózium	13.20-13.40	BOEHRINGER szimpózium
13.50-15.25	LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA		
15.25-15.55	Kávészünet		
15.55-16.20	Szimpóziumok		
	NAGYTEREM		BÁLTEREM
15.55-16.20	NOVO NORDISK szimpózium	15.55-16.15	BERLIN-CHEMIE szimpózium
16.20-18.15	KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA		
18.15-18.20	Technikai szünet		
	NAGYTEREM		BÁLTEREM
		18.20-18.30	Ünnepélyes megnyitó
		18.30-19.00	Esti előadás
		19.00-	Vacsora
20.00-21.30	Esti előadások		

2022. május 18. (szerda)			
08.00-10.00	GYÓGSZERCSOPORTOK		
10.00-10.30	Kávészünet		
10.30-11.00	ABBVIE szimpózium		
11.00-12.00	KLASSZIKUS REUMATOLÓGIAI KÓRKÉPEK KEZELÉSE		
12.00-13.30	ARTHRITISEK KEZELÉSE		
13.30-14.30	Ebédszünet		
14.30-15.30	Szimpóziumok		
	NAGYTEREM		BÁLTEREM
14.30-14.45	ROCHE szimpózium	14.30-14.50	JANSSEN szimpózium
14.45-15.00	KRKA szimpózium	14.50-15.00	STADA szimpózium
15.00-15.20	EGIS szimpózium	15.00-15.20	SAGER szimpózium
15.30-16.45	AUTOIMMUN REUMATOLÓGIAI KÓRKÉPEK KEZELÉSE I.		
16.45-17.15	Kávészünet		
17.15-17.45	Szimpóziumok		
	NAGYTEREM		BÁLTEREM
17.15-17.45	RICHTER szimpózium	17.15-17.35	LILLY szimpózium
		17.35-17.45	ASTRAZENECA szimpózium
17.45	A tudományos program vége		
20.00-	Vacsora		

2022. május 19. (csütörtök)

09.00-10.00	AUTOIMMUN REUMATOLÓGIAI KÓRKÉPEK KEZELÉSE II.
10.00-10.30	Kávészünet
10.30-12.00	HATÁRTERÜLETI KÓRKÉPEK I.
12.00-13.00	Ebédészünet
13.00-14.35	HATÁRTERÜLETI KÓRKÉPEK II.
14.35-15.00	Kávészünet
15.00-17.15	EGYÉB KEZELÉSI ELJÁRÁSOK
17.15-17.30	Tesztírás, zárás





HYRIMOZ®▽

ADALIMUMAB A SANDOZTÓL 40 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN

» RA-ban a referencia termékkel megegyező hatásosság és biztonsági profil¹

» A SensoReady toll könnyen kezelhető²



▽ Ez a gyógyszer fokozott figyelmet igényel, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást az OGYÉ-nek az online kiöltés bejelentőlapján, a lelőltés bejelentőlapján (https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/mellhat_bejelentolap2015_MG2.pdf) az adr.box@ogyei.gov.hu e-mail címen, a (+36) 1 886-9472 faxszámon vagy az OGYÉL, 1372 Budapest, Pf. 450. levelezési címen.

Irodalom:

1. P. Willard et al.: A Randomized, Double-Blind, Parallel-Group, Multicenter Study to Compare the Efficacy, Safety and Immunogenicity of a Proposed Adalimumab Biosimilar (GP2017) with Reference Adalimumab in Patients with Moderate-to-Severe Active Rheumatoid Arthritis ABSTRACT NUMBER: 1936 2018 ACR/ARHP Annual Meeting
2. Bernd Tischer et al.: Patients' and nurses' preferences for autoinjectors for rheumatoid arthritis: results of a European survey. Patient Preference and Adherence 2018;12: 1413-1424

Hyrimoz® 40 mg (adalimumab) oldatos injekció SensoReady előretöltött injekciós tollban

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!
A hatályos alkalmazási előírás teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésetudományi Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) vagy az Európai Gyógyszerügynökség (www.ema.europa.eu) honlapokon. **Elérési útvonal:** www.ogyei.gov.hu; Adatbázisok, nyilvántartások; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve: Hyrimoz 40 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban; Keresés indítása: ikon vagy [Kisérőiratok](#) hiperlink. A 9/1993 NM rendelet alapján teljes elszámolás alá eső hatányanyagot tartalmaz,

a felhasználásra jogosult intézmények számára a Nemzeti Egészségügyi Biztonsági Alapkezelő központi kábészerezés keretében szerzi be.
Bruttó fogyasztói ára: 173 691 Ft. Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat.
Elérési útvonal: <http://www.neak.gov.hu>; szakmának; gyógyszer/gygyfurdó; egészségügyi szakembereknek; publikus gyógyszer-törzs; végleges; Publikus gyógyszer-törzs – lakossági tájékoztató. Kizárólag egészségügyi szakembereknek szóló kommunikáció. Kérjük, ne tegyék a fogyasztók részére elérhetővé vagy láthatóvá!

A dokumentum lezárásának időpontja:
2022. 03. 22. • SHY928/03.22

SANDOZ A Novartis
Division

Sandoz Hungária Kft. • 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Tel.: 430-2890 • Fax: 430-2899 • web: www.sandoz.hu

Hyrimoz®
adalimumab

Lassítsa az ILA progresszióját!



1 gyógyszer, három indikáció¹
4 nagy vizsgálat - 1990 ofev-vel kezelt beteg¹

IPF

SSc-ILA

PF-ILA

- Az ILA/ IPF korai felismerése kulcsfontosságú, mert a kórkép nem gyógyítható, de a progresszió lassítható^{1,2}
- SSc-ILA az egyik leggyakoribb szervi manifesztáció szisztémás szklerózisban, és az egyik vezető halálok ezeknél a betegeknél³
- PF-ILA - egy felmérés alapján⁴ az ILA-s betegek 18-32% -ánál áll fenn a progresszív fibrotizáló fenotípus kialakulásának kockázata⁴

Az alkalmazási előírás a QR kódon keresztül érhető el.



A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Boehringer Ingelheim International GmbH. A forgalomba hozatali engedély számai: EU/1/14/979/001-004. Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (SZ). TB támogatás mértéke az IPF esetében Eü 100%. SSc-ILA és PF-ILA indikációk jelenleg nem támogatottak.

Eü 100 BNO J84 – az arra kijelölt centrumokban. Magyar Közlöny 2017. évi 78. szám 7986 oldal 11-es pont.

<http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17078.pdf>

A termékek árával kapcsolatban a változásokat a http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurd_o_tamogatas/egeszsegugyi_vallalkozasoknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html honlapon tudja követni.

Használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a részletes alkalmazási előírást!

Irodalmak:

1) OFEV alkalmazási előírás 2021.01.07. 2) Avouac et al. Ann Rheum Dis 2011;70:476-81. 3) Steen & Medsger. Ann Rheum Dis 2007;66:940-4. 4) Wijssen-beek MS, Kreuter M, Olson A, et al Curr Med Res Opin. 2019;35(11):2015-2024

Készítmény megnevezése	Közfinanszírozás alapjául elfogadott ár (Ft)	TB támogatás mértéke	Vonatkozó indikációs pont	Beteg által fizetendő ár (Ft)
OFEV 150mg 60x	708 417	Eü 100 (J84)	62	300
OFEV 100mg 60x	434 026	Eü 100 (J84)	62	300



**Boehringer
Ingelheim**

Orvosi információ: medinfo.hu@boehringer-ingelheim.com

Boehringer Ingelheim
RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe
1095 Budapest, Lechner O. fasor 10.
Tel.: 1 299-8900; Fax: 1 299-8901
www.boehringer-ingelheim.hu

PC-FIL-102228
1. kiadás dátuma:
2021.09.25

- 10.00 STATE-OF-THE ART ELŐADÁSOK**
Üléselnökök: Szekanecz Zoltán, Nagy György
- 10.00 A reumatológiai kórképek epidemiológiája**
Péntek Márta
Óbudai Egyetem, Budapest
- 10.15 Régmúlt diagnosztikák és kezelések**
Gömör Béla
Semmelweis Egyetem ÁOK, Budapest
- 10.30 Molekulák, mint terápiás célpontok**
Nagy György
Semmelweis Egyetem ÁOK, Budapest
- 10.45 Drug development in autoimmune and inflammatory rheumatic diseases**
Ladislav Senolt
Charles University, Prague, Czech Republic
- 11.05 A pulmonológia határterületi kérdései**
Müller Veronika
Semmelweis Egyetem ÁOK, Budapest
- 11.20 Az allergiás tüdőbetegségek (asthma, EGPA) terápiája**
Vaskó Attila
Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen
- 11.35 Sürgősségi reumatológia**
Ujvárosy Dóra
Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen
- 11.50 Ebédszünet**

12.50 Szimpóziumok

Nagyterem

- 12.50 NOVARTIS SZIMPÓZIUM (30')**
Diagnózis korán, pontosan – az első lépés az axiális SpA sikeres terápiájához.
Üléselnök: Szekanecz Zoltán
- Előadók:
Szamosi Szilvia, Szűcs Gabriella
Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen
- 13.20 SANOFI SZIMPÓZIUM (30')**
Üléselnök: Szekanecz Zoltán
- Változatos csontbetegségek - új szemlélet néhány ritka betegségben**
Horváth Csaba
Semmelweis Egyetem ÁOK, Budapest

Bálterem

- 12.50 PFIZER SZIMPÓZIUM (30')**
- JAK-gátlók a rheumatoid arthritis kezelésében: fókuszban a fájdalom és egyéb betegértékelésen alapuló egészségkimenetek**
Nagy György
Semmelweis Egyetem ÁOK, Budapest
- 13.20 BOEHRINGER SZIMPÓZIUM (20')**
- Az intersticiális tüdőbetegség multidiszciplináris kezelése: immunszuppresszió és antifibrotikus terápia**
Szamosi Szilvia
Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen

- 13.50 LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA**
Üléselnökök: Nagy Gábor, Harjit Pal Bhattoa
- 13.50 Antinukleáris antitest meghatározás**
Ábel György
Lahey Clinic, Burlington, MA
- 14.10 Immunszerológiai és autoantitest meghatározás**
Nagy Gábor
Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen
- 14.25 Immunológiai sejtes vizsgálatok**
Nagy Eszter
Országos Mozgásszervi Intézet, Budapest
- 14.40 Csonthiokémiai markerek és csont képzőanyagok**
Harjit Pal Bhattoa
Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen
- 14.55 Molekuláris genetikai vizsgálatok a reumatológiában**
Balogh István
Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen
- 15.10 Kóreljáró és diagnosztikus értékű szövettani elváltozások
autoimmun megbetegedésekben, a kristálydiagnosztika
jelentősége**
Bély Miklós
Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest
- 15.25 Kávészünet**

15.55 Szimpóziumok

Nagyterem

15.55 NOVO NORDISK SZIMPÓZIUM (25')

Miért érdemes gyógyszeresen is kezelni az elhízást?

Szekanecz Zoltán

Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen

Bálterem

- 15.55 BERLIN-CHEMIE SZIMPÓZIUM (20')**
Kardiovaszkuláris aktualitások a köszvény terápiaájában
 Pállinkás Márton
Országos Mozgásszervi Intézet, Budapest
-
- 16.20 KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA**
 Üléselnökök: Bálint Péter, Kovács László
- 16.20 Modern képalkotók a reumatológiában**
 Gaál Veronika
Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen
- 16.35 Reumatológiai ultrahang**
 Bálint Péter
Országos Mozgásszervi Intézet, Budapest
- 16.50 CT and MRI in rheumatology**
 Mariusz Korkosz
Jagellonian University, Cracow, Poland
- 17.10 PET/CT a reumatológiában: szlovákiai tapasztalatok**
 Stenová Emőke
University Hospital, Bratislava, Slovakia
- 17.30 Elavult-e a csontszcintigráfia? – hagyományos nukleáris
 medicinai vizsgálatok reumatológiai kórképekben**
 Garai Ildikó
Scanomed Kft., Debrecen
- 17.45 Fúziós képalkotó technikák**
 Kovács László
Szegedi Tudományegyetem ÁOK, Szeged
- 18.00 Elektrofiziológiai vizsgálatok**
 Boczán Judit
Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen

**18.15 A tudományos program vége, technikai szünet, folytatás a
BÁLTEREMBEN**

18.20 Ünnepélyes megnyitó

18.30 Esti előadás: Rockzene hatása a térdízületemre (30')
Bender Tamás
Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest

19.00 Vacsora

**20.00 Esti előadások a
NAGYTEREMBEN**

20.00 Megismerni az ismeretlent – a Covid19 árnyékában (30')
Bokor Éva
*California Institute of Technology (CALTECH) – NASA Jet Propulsion
Laboratory, Pasadena, CA, USA*

Zene és pszichiátria: terápia zenével
Bokor Gyula
University of Massachusetts Medical School, Worcester, MA, USA

20.30 Szakmai beszélgetés



Anabolikus terápia szekunder törésprevencióban

TERROSA® Építsük együtt!


Terrosa®
teriparatide

A 2020. évi
Magyar Innovációs Nagydíj
nyertese



 **RICHTER GEDEON**

 **MAGYAR
GYÓGYSZER**

Richter Gedeon Nyrt., székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., www.gedeonrichter.com

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

Mellékhatás / Nemkívánatos esemény bejelentése és orvosszakmai kérdés esetén elérhetőség: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu.

A termék alkalmazásával kapcsolatos információkról a termekinformacio.richter.hu címen érdeklődhet.

Document ID: KEDP/DAD9XN, Lezárás dátuma: 2022.04.20.



Terrosa® 20 mikrogramm/80 mikroliter oldatos injekció 1x
Teljes ár/TB támogatás/Térítési díj 1x patron: 71 522 Ft/64 370 Ft/7 152 Ft
Terrosa® 20 mikrogramm/80 mikroliter oldatos injekció 1x2,4 ml patron és injekciós toll készlet:
Teljes ár/TB támogatás/Térítési díj: 71 522 Ft/64 370 Ft/7 152 Ft
https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=157962
A szövegellenőrzés dátuma: A gyógyszerrel részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség
internetes honlapján (<http://www.ema.europa.eu>).

- 8.00 GYÓGYSZERCSONPORTOK**
Üléselnökök: Hodinka László, Szántó Sándor
- 8.00 Fájdalomesillapítás, gyulladásgátlás**
Vereckei Edit
Országos Mozgásszervi Intézet, Budapest
- 8.15 Kortikoszteroidok**
Szekanecz Zoltán
Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen
- 8.30 Konvencionális szintetikus betegségmódosító szerek**
Hodinka László
Országos Mozgásszervi Intézet, Budapest
- 8.45 TNF- α : az ízületeken innen és túl**
Balog Attila
Szegedi Tudományegyetem ÁOK, Szeged
- 9.00 IL-6 gátlók**
Kardos Zsófia
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kórház, Miskolc
- 9.15 IL-12 és IL-23 gátlók**
Bodnár Nóra
Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen
- 9.30 IL-17 gátlók**
Szántó Sándor
Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen
- 9.45 Tirozinkináz-gátlók**
Végh Edit
Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen
- 10.00 Kávészünet**

10.30 ABBVIE SZIMPÓZIUM

Üléselnökök: Szántó Sándor, Szűcs Gabriella

Rheumatoid arthritis: Hogyan tovább biológiai terápiák után? (20')

Pállinkás Márton¹, Szamosi Szilvia²

¹Országos Mozgásszervi Intézet, Budapest

²Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen

Mi újság a sypondylitis ankylopetica kezelésében? (10')

Nagy-Vincze Melinda

Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen

11.00 KLASSZIKUS REUMATOLÓGIAI KÓRKÉPEK KEZELÉSE

Üléselnökök: Lakatos Péter, Kovács Attila

11.00 Osteoarthritis

Gaál János

Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen

11.15 Derékfájás

Bartha Attila

Jósa András Kórház, Nyíregyháza

11.30 Osteoporosis

Lakatos Péter

Semmelweis Egyetem ÁOK, Budapest

11.45 Regionális fájdalom szindrómák

Kovács Attila

Semmelweis Kórház, Kiskunhalas

12.00 ARTHRITISEK KEZELÉSE

Üléselnökök: Czirják László, Géher Pál

12.00 Arthritisek és autoimmun betegségek kezelésének modern szemlélete

Czirják László

Pécsi Tudományegyetem ÁOK, Pécs

12.15 Rheumatoid arthritis

Surányi Péter

Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen

- 12.30 Axiális spondylarthritisek**
Géher Pál
Semmelweis Egyetem ÁOK, Budapest
- 12.45 Arthritis psoriatica**
Pethő Zsófia
Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen
- 13.00 Juvenilis idiopathiás arthritis**
Káposzta Rita
Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen
- 13.15 Köszvény és más felnőttkori autoinflammatorikus kórképek**
Szamosi Szilvia
Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen
- 13.30 Ebédszünet**

14.30 Szimpóziumok**Nagyterem**

- 14.30 ROCHE SZIMPÓZIUM (15')**
Régi hatékonyság új köntösben: a tocilizumab szerepe a COVID 19 kezelésében
Szekanecz Zoltán
Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen
- 14.45 KRKA SZIMPÓZIUM (15')**
Az etoricoxib helye a mozgásszervi kórképek kezelésében
Szekanecz Zoltán
Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen
- 15.00 EGIS SZIMPÓZIUM (20')**
Húgysavról kristálytisztán
Szekanecz Zoltán
Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen

Bálterem

14.30 JANSSEN SZIMPÓZIUM (20')

Az elsődleges betegutak arthritis psoriaticában

Végh Edit

Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen

14.50 STADA SZIMPÓZIUM (10')

Fájdalomcsillapítási lehetőségek reumatológiai kórképekben.

Pethő Zsófia

Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen

15.00 SAGER SZIMPÓZIUM (20')

Porcvédelem immunológus szemmel

Szűcs Gabriella

Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen

A fájdalomterápiás lépcső alkalmazása a mozgásszervi betegségek kezelésében, fókuszban a kardiovaszkuláris rizikós betegek

Szántó Sándor

Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen

15.30 AUTOIMMUN REUMATOLÓGIAI KÓRKÉPEK KEZELÉSE I.

Üléselnökök: Szűcs Gabriella, Tarr Tünde

15.30 SLE

Kiss Emese

Országos Mozgásszervi Intézet, Budapest

15.45 Antifoszfolipid szindróma

Tarr Tünde

Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen

16.00 Szisztémás sclerosis

Szűcs Gabriella

Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen

16.15 Idiopathiás inflammatorikus myopathiák

Griger Zoltán

Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen

16.30 Sjögren szindróma

Szántó Antónia

Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen

16.45 Kávészünet

17.15 Szimpóziumok

Nagyterem

17.15 RICHTER SZIMPÓZIUM (30')

A csonttritkulás kezelése és az életminőség kapcsolata

Üléselnök: Szekanecz Zoltán

Bevezető

Szekanecz Zoltán

Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen

Mindennapi csodák - a teriparatid terápia életminőségre gyakorolt hatása

Pethő Zsófia

Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen

A csonttritkuláshoz társuló fájdalom csillapításának lehetőségei

Bodoki Levente

Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen

Bálterem

17.15 LILLY SZIMPÓZIUM (20')

Gyakori és nehéz terápiás döntések- Mi legyen a megoldás?

Rögös úton a remisszió felé rheumatoid arthritisben

Szamosi Szilvia

Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen

Kihívások az arthritis psoriaticás betegünkénél

Szűcs Gabriella

Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen

17.35 ASTRAZENECA SZIMPÓZIUM (10')

Anifrolumab az SLE kezelésében

Szűcs Gabriella

Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen

17.45 A tudományos program vége

20.00 Vacsora

Esti előadás: a whiskykről (30')

Lakatos Péter

Semmelweis Egyetem, Budapest





ZESSLY® (INFLIXIMAB)¹

ÚJ FEJEZET A TNF- α GÁTLÓK KÖRÉBEN.²



▽ Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett melléhatást az OGYÉ-nek az online kitölthető bejelentőlapon, a letölthető bejelentőlapon (https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/mellhat-bejelentolap2015_MG2.pdf) az adr.box@ogyei.gov.hu e-mail címen, a (+36) 1 886-9472 faxszámon vagy az OGYÉI, 1372 Budapest, Pf. 450. levelezési címen.

Zessly® 100 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! A hatályos alkalmazási előírás teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) vagy az Európai Gyógyszerügynökség (www.ema.europa.eu) honlapokon.

Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; Adatbázisok, nyilvántartások; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve: Zessly 100 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz; Keresés indítása; ikon vagy [Kísérőíratok](#) hiperlink.

A 9/1993 NM rendelet alapján tételes elszámolás alá eső hatóanyagot tartalmaz, a felhasználásra jogosult intézmények számára a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő központi közbeszerzés keretében szerzi be. **Bruttó fogyasztói ára:** 97 120 Ft.

Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat!

Elérési útvonal: <http://www.neak.gov.hu>; szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfűrdő; egészségügyi szakemberek; publikus gyógyszerterörzs; végleges; Publikus gyógyszerterörzs – lakossági tájékoztató.

Kizárólag egészségügyi szakembereknek szóló kommunikáció. Kérjük, ne tegyék a fogyasztók részére elérhetővé vagy láthatóvá!

¹ Zessly alkalmazási előírás (https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/zesslyepar-product-information_hu.pdf (legutolsó megtekintés: 2022.03.30))

² S. Mpcu et al.: Anti-TNF- α therapies: they are all the same (aren't they?). Rheumatology 2005;44:271–273

MERT AZ ÉLETBEN NINC MEGÁLLÁS

A TREMFYA® a közepesen súlyos, súlyos plakkos psoriasis és az arthritis psoriatica kezelésére javallt.³



A BŐRTÜNETEK ERŐTELJES CSÖKKENTÉSE¹

A bőrtünetek gyors, tartós csökkente 5 éven keresztül PsO esetén¹



AZ ÍZÜLETI TÜNETEK JELENTŐS JAVÍTÁSA²

Az ízületi tünetek tartós javulása 2 éven keresztül PsA esetén²



IGAZOLTAN TARTÓS HATÁS^{1,2}

A kezelést TREMFYA®-val kezdő betegek többsége hosszú távon is a TREMFYA®-terápián maradt^{1,2}

Hivatkozások

1. Griffiths CEM, et al. Maintenance of Response Through 5 Years of Continuous Guselkumab Treatment: Results From the Phase 3 VOYAGE 1 Trial. Presented at the 18th Annual Coastal Dermatology Symposium, October 15-16, 2020; 2. McInnes IB, et al. Efficacy and Safety of Guselkumab, a Monoclonal Antibody Specific to the p19-Subunit of Interleukin-23, Through 2 Years: Results from a Phase 3, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study Conducted in Biologic-naïve Patients with Active Psoriatic Arthritis. Presented at Innovations in Dermatology Conference, March 16-20, 2021. Online; 3. Tremfya® Alkalmazási előírás. 2022.01.13.

RÖVIDÍTETT ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

TREMFYA® 100 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben, TREMFYA® 100 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tolban (guselkumab)

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer Alkalmazási előírását! A hatályos Alkalmazási előírás teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) honlapján.

▼ Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.



Szakorvosi/kórházi diagnózist követően folyamatos szakorvosi ellenőrzés mellett alkalmazható, kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (Sz). A forgalomba hozatali engedély száma: EU/1/17/1234/001-002. A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Janssen-Cilag International NV Belgium, helyi képviselő: Janssen-Cilag Kft., Nagyenyed u. 8-14, H-Budapest, 1123. Tel: +36 1 884-2858.

A TREMFYA® a 9/1993 NM Rendelet 5. indikációs pontja alapján plakkos psoriasis indikációban teljes finanszírozás alá eső készítmény, az alkalmazó intézmények számára a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő központi közbeszerzés keretében szerzi be, illetve az egyes intézmények által felhasználható kvótákat ugyancsak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő osztja fel az intézmények között.

A közfinanszírozás alapjain el fogadott bruttó fogyasztói ár: 100 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben: 593 308 Ft; 100 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tolban: 593 308 Ft. Az esetleges árváltozásról, kérjük, tájékozódjon a www.neak.gov.hu honlapról.

A TREMFYA® a 9/1993 NM Rendelet 5. indikációs pontja alapján plakkos psoriasis illetve plakkos psoriasis és súlyos arthritis psoriatica egyidejű fellépése esetén teljes finanszírozás alá eső készítmény. A 9/1993 NM Rendelet 4. indikációs pontjában meghatározott, aktív, súlyos arthritis psoriaticában szenvedő betegek kezelésére vonatkozólag közfinanszírozásban nem részesül. Társadalombiztosítási támogatása egyedi méltányosság keretében kérelmezhető.

9.00 AUTOIMMUN REUMATOLÓGIAI KÓRKÉPEK KEZELÉSE II.

Üléselnökök: Kumánovics Gábor, Constantin Tamás

9.00 ANCA-asszociált vasculitisek

Kumánovics Gábor

Pécsi Tudományegyetem ÁOK, Pécs

9.15 Nagyér- és egyéb vasculitisek

Bodoki Levente

Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen

9.30 Gyermekkori autoimmun kórképek

Constantin Tamás

Semmelweis Egyetem ÁOK, Budapest

9.45 Autoimmun reumatológiai betegségek intenzív terápiaja

Kerekes György

Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen

10.00 Kávészünet**10.30 HATÁRTERÜLETI KÓRKÉPEK I.**

Üléselnökök: Szegedi Andrea, Papp Mária

10.30 Pustulosus bőrtünetek és reumatológiai kórképek kapcsolata

Szegedi Andrea

Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen

10.45 Psoriasis

Gáspár Krisztián

Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen

11.00 Gyulladásos bélbetegségek

Molnár Tamás

Szegedi Tudományegyetem ÁOK, Szeged

11.15 Hepatológia

Papp Mária

Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen

11.30 Neurológia

Csépány Tünde

Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen

- 11.45 Szemészet**
Módis László
Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen
- 12.00 Ebédszünet**
- 13.00 HATÁRTERÜLETI KÓRKÉPEK II.**
Üléselnökök: Mátyus János, Váróczy László
- 13.00 Hematológia**
Váróczy László
Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen
- 13.15 Onkológia**
Szekanecz Éva
Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen
- 13.30 Kardio-Reumatológia: Kardiológus konzílium reumatológiai kórképekben. Speciális szempontok.**
Müller Gábor
Semmelweis Egyetem ÁOK, Budapest
- 13.45 Endocrine disorders**
Zelmira Macejova
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovakia
- 14.05 Nefrológia**
Mátyus János
Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen
- 14.20 Ritka kórképek**
Brúgós Boglárka
Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen
- 14.35 Kávészünet**

- 15.00 EGYÉB KEZELÉSI ELJÁRÁSOK**
Üléselnökök: Bender Tamás, Varjú Cecília
- 15.00 Fizioterápia**
Bender Tamás
Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest
- 15.15 Balneoterápia**
Nagy Katalin
Markhot Ferenc kórház, Eger
- 15.30 Manuálterápia, alternatív gyógymódok kritikusan**
Király Márta
Petz Aladár kórház, Győr
- 15.45 Szisztémás autoimmun betegek rehabilitációja és az eredményesség követésének javasolt módszerei**
Varjú Cecilia
Pécsi Tudományegyetem ÁOK, Pécs
- 16.00 Sportrehabilitáció**
Némethné Gyurcsik Zsuzsanna
Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen
- 16.15 Radiosynoviorthesis**
Szentesi Margit
Semmelweis Egyetem ÁOK, Budapest
- 16.30 Aferezisek**
Soltész Pál
Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen
- 16.45 Pszichoszomatika a reumatológiában**
Vincze Dávid
Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen
- 17.00 Dietetoterápia**
Szalayné Kónya Zsuzsa
Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen
- 17.15 Tesztírás, zárás**
- 17.30 A program vége**

ARANY FOKOZATÚ EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNER

abbvie

EZÜST FOKOZATÚ EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK



RICHTER GEDEON



SANDOZ A Novartis
Division

BRONZ FOKOZATÚ EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK



KIÁLLÍTÓK / HIRDETŐK

Amgen Kft.

AstraZeneca Kft.

Bausch Health Magyarország Kft.

Csokisziget

Egis Gyógyszergyár Zrt.

ÉKbólt

Endo-Plus-Service Kft.

Gulipán Travel

Kőrös-Net Kft.

Krka Magyarország Kereskedelmi Kft.

Lux Hungária Kft.

Medicina Könyvkiadó Zrt.

MSD Pharma Hungary Kft.

Novartis Hungária Kft.

Promenade Orvosi Kiadó

Sager Pharma Kft.

...MERT
MINDENKIT
HAZAVÁRNAK

 **RoACTEMRA[®]**
tocilizumab

A régi hatékonyság új köntösben:

Bizonyított hatékonyság már COVID 19-ben is

A RoActemra a COVID-19 kezelésére javasolt olyan felnőtteknél, akik szisztémás kortikoszteroidokat kapnak és kiegészítő oxigénterápiára vagy gépi lélegeztetésre szorulnak.

- A Roactemra a kiinduláskor szisztémás kortikoszteroidot kapó betegeknek, **21%-kal** csökkentette a 28. napig bekövetkező halálozás kockázatát¹ (Relatív hazard:0.79, 95%-os CI: 0,70-0,89)
- Több mint **9 nappal** rövidítette a kórházi tartózkodást az eddigi szokásos ellátáshoz képest¹
- A kiinduláskor invazív lélegeztetést nem igénylő betegeknek tocilizumab terápia mellett ritkábban volt szüksége a 28. napig **gépi lélegeztetésre** a szokásos kezeléshez képest¹

Az új SARS-CoV-2 variáns, az Omicron (B.1.1.529) közelmúltbeli megjelenését követően a WHO arról számolt be, hogy **az interleukin 6 receptor blokkolók, mint például a RoActemra, várhatóan továbbra is hatékonyak lesznek a betegek kezelésében**²

Referenciák: 1. RoActemra alkalmazási előírát 2. World Health Organization. Update on Omicron: <https://www.who.int/news/item/28-11-2021-update-on-omicron>

M-HU-00000434; Dokumentum zárásának időpontja: 2022.04.05.

RoActemra 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz: Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást. A feltételezett mellékhatásokat bejelentheti közvetlenül a hatóság részére a hatóság honlapján található bejelentő lapon: <https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszer-mellekhatas>. A bejelentő lapot elküldheti e-mailen: adr.box@ogyei.gov.hu, faxon: +36-1-886-9472 vagy postai úton (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 1372 Budapest, Pf. 450. A nemkívánatos események a Roche gyógyszerbiztonsági egysége felé is jelenthetők: a www.roche.hu honlapon található bejelentő lapon, a hungary.drugsafety@roche.com email címen vagy az alábbi elérhetőségeken: Roche (Magyarország) Kft. H-1112 Budapest, Balatoni út 2/a. Tel: 0612794505, Fax: 0612794506


Bővebb információ: Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását: https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis?action=show_details&item=33180 Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon a Publikus gyógyszerértéztörslakossági tájékoztató alatt található információkat.



**További információval
rendelkezésre áll:**
Roche (Magyarország) Kft.,
1112 Budapest, Balatoni út 2/a.
Tel: 06 1 279 4500,
Fax: 06 1 279 4501,
E-mail:
hungary.medinfo@roche.com,
www.roche.hu

OBEZITÁS

Változtassunk rajta időben!



Saxenda® a testsúly csökkentésére kiegészítő kezelésként 12 éves kortól.^{1*}

„V” - Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

*A Saxenda® a testtömeg csökkentésére kiegészítő kezelésként szolgál a fokozott fizikai aktivitás, valamint felnőtt betegek esetében a csökkentett kilokalória tartalmú étrend, serdülők (≥12 év) esetében pedig az egészséges táplálkozás mellett.¹

További részleteket az alkalmazási előírás 4.1 pontja tartalmaz.

A modellek illusztrációs célt szolgálnak.

Referencia: 1. Saxenda® alkalmazási előírás

A GYÓGYSZER NEVE: Saxenda® 6 mg/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban
MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL: 6 mg liraglutidot* tartalmaz 1 ml oldatban, 18 mg liraglutidot tartalmaz 3 ml-ben, előretöltött injekciós tollként.

*humán glukagon-szerű peptid-1- (GLP-1-) analóg, rekombináns DNS-technológiával Saccharomyces cerevisiae-ben előállítva.

GYÓGYSZERFORMA: Oldatos injekció. Tiszta és színtelen vagy csaknem színtelen, izotóniás oldat; pH = 8,15.

A KÉSZÍTMÉNY RENDELÉSE ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL A HATÁLYOS TELJES ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁST!



A hatályos alkalmazási előírás teljes szövege megtalálható az Európai Gyógyszerügynökség honlapján:
<https://www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Saxenda#product-information-section>

Megjegyzés: A QR kód a készítmény oldalára mutat. A magyar nyelvű alkalmazási előírás ezen az oldalon a Product Information szakasz első lenyíló listájában (Available languages), a Hungarian szóra kattintva érhető el.

FELTÉTELEZETT MELLÉKHATÁSOK BEJELENTÉSE: A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az alábbi elérhetőségek valamelyikén keresztül: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, Postafiók 450, H-1372 Budapest; honlap: www.ogyei.gov.hu.

TÁMOGATÁSSAL, ÁRRAL VALAMINT RENDELHETŐSÉGGEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ:

A Saxenda® 6 mg/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban osztályozási besorolása:

„V” - Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

Társadalombiztosítás által elfogadott árral és támogatással nem rendelkezik.

A Saxenda® a Novo Nordisk A/S, Dánia védjegye. © 2022 Novo Nordisk A/S

HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓS IRODA NYITVATARTÁSA

Május 17-én, csütörtökön: 8.00-18.30

Május 18-án, pénteken: 7.30-18.00

Május 19-én, szombaton: 8.30-18.00

A regisztrációs iroda telefonszáma: 30/977-4007

(csak május 17-18-19-én hívható!)

RÉSZVÉTELI DÍJAK A HELYSZÍNEEN

Normál regisztráció	55 000 Ft (43 307 Ft + ÁFA)
Nyugdíjasok, szakorvosjelöltek, rezidensek	45 000 Ft (35 433 Ft + ÁFA)
PhD hallgatók, szakdolgozók	40 000 Ft (31 496 Ft + ÁFA)
Cégek képviselői	45 000 Ft (35 433 Ft + ÁFA)
Napijegy	24 000 Ft (18 898 Ft + ÁFA)

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK

A részvételi díjak (kivéve napi díj) 24 000 Ft közvetített étkezést tartalmaznak, melyet a számlán feltüntetünk.

A regisztrált résztvevők részvételi díja tartalmazza:

- Részvételt a szakmai programon
- Az akkreditációs pontokat
- A kiállítás megtekintésének jogát
- Programfüzetet
- Kongresszusi táskát, jegyzetfüzetet, tollat
- Kávészüneteket 3 napra
- Vacsorát május 17-18-án

Céges regisztráció tartalmazza:

- Részvételt a szakmai programon
- Programfüzetet
- Kávészüneteket 3 napra
- Vacsorát május 17-18-án

Napijegy tartalmazza:

- Részvételt az adott napi szakmai programon
- Kiállítás megtekintésének jogát

EBÉD

Május 17-18-19-én a továbbképzés helyszínén, a Hotel Lycium Éttermében.

Díja: 5 900 Ft/ebéd (5 619 Ft + ÁFA)

ELŐADÁSOK

Kérjük az előadókat, hogy a számítógépes anyagok előkészítését időben végezzék el és a szekciók kezdete előtt legalább 1 órával adják le azokat a megadott helyen. A szoros időbeosztás miatt kérjük a rendelkezésre álló idő pontos betartását!

NÉVKITÚZÓ

A kongresszus ideje alatt kérjük a névkitűző használatát a helyszínre történő belépéshez

AKKREDITÁCIÓ

A **DROPP9** az allergológia és klinikai immunológia, belgyógyászat, bőrgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, gastroenterológia, háziorvostan, nukleáris medicina, orvosi laboratóriumi diagnosztika, radiológia, rehabilitációs medicina, reumatológia, tüdőgyógyászat szakterületek részére akkreditált szabadon választható továbbképző rendezvény, kódja: DE ÁOK/2022.I./00025

Tesztírás kötelező, 48 kreditpontról adunk igazolást.



Ebetrexat®

20 mg/ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben
metotrexát

Kezdő és fenntartó terápia Ebetrexat-tal¹



Termék neve	Hatóanyag mennyiség	Fogyasztói ár	Emelt 90% támogatás*	Térítési díj*
Ebetrexat® 1x0,5 ml előretöltött fecskendőben	10 mg	2 315 Ft	2 084 Ft	231 Ft
Ebetrexat® 1x0,75 ml előretöltött fecskendőben	15 mg	2 994 Ft	2 695 Ft	299 Ft
Ebetrexat® 1x1 ml előretöltött fecskendőben	20 mg	3 683 Ft	3 315 Ft	368 Ft
Ebetrexat® 1x1,25 ml előretöltött fecskendőben	25 mg	4 572 Ft	4 115 Ft	457 Ft

2022. április 1-jétől érvényes árak alapján: www.neak.gov.hu

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! A hatályos alkalmazási előírás teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésszabványügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) honlapon. Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; Adatbázisok; nyilvántartások; Gyógyszeradatbázis; Gyógyszer neve: EBETREXAT 20 mg/ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben (metotrexate L01BA01); a keresés indítása: **Alkalmazási előírás** hiperlink. Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat! Elérési útvonal: <http://www.neak.gov.hu>; szakmának: gyógyszer/gyse/gyógyfűrdő; egészségügyi szakembereknek; publikus gyógyszerforgó; végleges; Publikus gyógyszerforgó – lakossági tájékoztató.

* EU90/14/a.

¹ Ebetrexat alkalmazási előírás (www.ogyei.gov.hu)

Kizárólag egészségügyi szakembereknek szóló kommunikáció. Kérjük, ne tegyék a fogyasztók részére elérhetővé vagy láthatóvá.

SANDOZ A Novartis
Division

Sandoz Hungária Kft. : 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Tel: 430-2890 • Fax: 430-2899 • web: www.sandoz.hu
A dokumentum lezárásának időpontja: 2022.04.11. • SETX947/03.22

75 mg/25 mg

**Multimodális, hatásos analgézia
és az akut fájdalom gyors csillapí-
tása egyetlen tablettában^{1,3,4,5}**

Mérsékeltől súlyosig terjedő akut fájdalom esetén²

Opioid típusú analgetikum/NSAID²

Orális fix dózisú kombináció²

Szuperior fájdalomcsillapítás⁵

Gyorsabban kialakuló hatás^{5*}

Nagyobb mértékű és tartós fájdalomcsillapítás^{5*}

Kedvező biztonságossági profil⁵

* vs. 75 mg tramadol / 650 mg paracetamol kombináció

Terápiás javallatok²

Adagolás²

A mérsékelttől súlyosig terjedő akut fájdalom rövidtávú tüneti kezelése olyan felnőtt betegek számára, akiknél a fájdalom a tramadol és dexketoprofén kombináció alkalmazását teszi szükségessé.²

Felnőttek: A javasolt adag egy tablettát. Szükség szerint további dózisok alkalmazhatók, de az adagolási intervallum nem lehet 8 óránál rövidebb, és a kezelés időtartama nem haladhatja meg az 5 napot.²

▼ Skudexa 75 mg / 25 mg filmtabletta

75 mg tramadol-hidroklorid és 25 mg dexketoprofén filmtablettenként

Kérjük, olvassa el az alkalmazási előírás teljes szövegét a mellékhatások, ellenjavallatok és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések teljes listájáért.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

1. Moore RA, McQuay HJ, Tomaszewski J, Raba G, Tutunaru D, Lietuviene N, et al. BMC Anesthesiol. 2016; Jan 22:16-9.

2. SKUDEXA®. Alkalmazási előírás (2021.08.05.)

3. McQuay HJ, Moore RA, Berta A, Ganiufdinov O, Fülöp B, Ponganeckas N, et al. *Br J Anaesth*. 2016 Feb;116(2):269-76.

4 Moore RA, Gay-Escoda C, Figueiredo R, Tóth-Bogi Z, Dietrich T, Miller S, et al. *J Headache and Pain*. 2015;16:60

5 Gay-Escoda C, Hanna M, Monfaro A, Dietrich T, Miller S, Giergiel E, et al. *BMJ Open*. 2019 Feb

19;9(2):e023715. doi: 10.1136/bmjopen-2018-023715.

 BERLIN-CHEMIE
BERLIN-CHEMIE
 LABORATORIUMS-REAGENZIA **MENARINI**

HU-SKU-15-2021-v01-printed-#26878

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.

2040 Budapest, Neumann J. u. 1. Tel.: 23/501-301. Évesített dátum: 2023.08.24.

Ervenyesség dátuma: 2023.06.24.

Az előre megrendelt szállodai szobákat a résztvevő(k) nevére lefoglaltuk, azok a megküldött visszaigazolás szerint vehetők igénybe, általában az érkezés napján 14 órától az elutazás napján 10 óráig. Korábbi érkezés vagy későbbi elutazás esetén a csomagok elhelyezésében a szállodai porták nyújtanak segítséget.

SZÁLLÁSHELYEK

Hotel Lycium****

4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.

A szálloda a belvárosban található a kongresszus helyszíne, a Kölcsey Központ mellett.

Az ár tartalmazza a svédasztalos reggelit, a wellness és fitness részleg használatát, business corner használatot és internet használatot.

Parkolás: fedett mélygarázsban 3000 Ft/szmk./éj.

Hotel Divinus*****

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 1.

A szálloda a Nagyerdőn található, a villamos vonal mellett.

Az ár tartalmazza a büféreggelit, a szálloda fitness részlegének használatát, valamint vezetékes és wifi internethasználatot.

Parkolás: a szálloda előtt, foglaltság függvényében ingyenes, a szálloda mélygarázsában 4.000 Ft/autó/nap

Aquaticum Termál és Wellness Hotel****

4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.

A szálloda a Nagyerdőn található, a villamos vonalától pár perc sétára.

Az ár tartalmazza a svédasztalos reggelit és ingyenes wifi használatot.

Parkolás: felszíni parkolóban 3.000 Ft/szmk/nap, a mélygarázsban 2.000 Ft/szmk/nap

Centrum Hotel ***

4026 Debrecen, Kálvin tér 4-8.

A szálloda a belvárosban található, a kongresszus helyszínétől 5 perc sétára.

Az ár tartalmazza a svédasztalos reggelit, kávé-tea bekészítést vízforralóval, valamint korlátlan vezeték nélküli Internet használatot.

Parkolás: a szállodával szemben található parkolóban ingyenes.

Hunguest Hotel Nagyerdő Debrecen***

4032 Debrecen, Pallagi út 5.

A szálloda Debrecen legszebb zöldövezeti területén, a Nagyerdő szívében fekszik.

Az ár tartalmazza a büfé asztalos reggelit, a szálloda saját fedett termálvizes medencéjének és szaunájának használatát, illetve ingyenes WIFI használatot.

Parkolás: a szálloda parkolójában díjmentes

Hotel Óbester****

4026 Debrecen, Péterfia u. 49.

A szálloda a belvárosban található, a villamosvonal mellett, 10 percnyi sétára a kongresszus helyszínétől.

Az ár tartalmazza a svédasztalos reggelit, kávé-tea bekészítést vízforralóval, valamint korlátlan vezeték nélküli Internet használatot.

Parkolás: a szálloda zárt parkolójában ingyenes.

Malom Hotel****

4027 Debrecen, Böszörményi út 1.

A szálloda a kongresszus helyszínétől 10 perc sétára található.

Az ár tartalmazza a svédasztalos reggelit, valamint korlátlan wifi használatot.

Parkolás: korlátozott számban a szálloda zárt parkolójában ingyenes.

Hotel Platán ****

4030 Debrecen, Somlyai u. 10.

A szálloda Debrecen kertvárosi részén, a nemzetközi reptér közvetlen közelében található.

Az ár tartalmazza a büféasztalos reggelit és az Internet használatát.

Parkolás: a szálloda parkolójában ingyenes.



doreta[®] SR

tramadol/paracetamol 75 mg/650 mg
retard tabletta



Egyedülálló
retard tramadol
kombináció a
magyarországi
piacon.^{1,2}

Doreta[®] SR

Rugalmasan a fájdalom ellen

	Bruttó fogászati ár (Ft)	Normatív támogatási összeg (Ft)	Térítési díj normatív támogatás esetén (Ft)	Kiemelt támogatási összeg (Ft)	Térítési díj kiemelt támogatás esetén (Ft)	Közfoglalkoztatottak kiváltható-e
Doreta SR 75 mg / 650 mg 30x retard tabletta	1 634	372	1 262	1 334	300	✓


Az árak 2022. április 1-jétől érvényesek. A mindenkor aktuális árakról, az EÜ100 8/b2. történő felirhatósággal kapcsolatos és a közgyógyellátás keretében való kiválthatóság feltételeiről bővebb információkat a NEAK honlapján - <http://neak.gov.hu/> - találhat.

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! A hatályos alkalmazási előírás:
https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=119267

Irodalom:

1. IMS adatbázis 2. A Magyarországon forgalmazott TB-támogatásban részesülő tramadol kombinációjú készítmények között. Publikus Gyógyszerszótárs (PUPHA) adatbázis 2021. február 1. <http://neak.gov.hu/>





Neurológiai események: demyelinizációs folyamatok esetén a kezelés előtti gondosan mérlegelni kell annak előnyeit és kockázatát. Ha ezek a kórképek kialakulnak, mérlegelni kell a kezelést leállítani. **Szélsőséves beavatkozások:** tervezésükkor figyelembe kell venni a hosszú levetési időt. A kezelés alatt működő betegnél figyelni kell a fertőzések kialakulását, és meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket. **Autoimmun folyamatok:** lupus-szerű szindrómára utaló tünetek és kórszindrómák EN elleni antitest-pozitívitás esetén a kezelést abba kell hagyni. **Hematológiai reakciók:** a kezelés leállítását megértesítendő, jelentős haematológiai eltéréseknél meg kell fontolni. **Váltsós biológiai DMARD-ok között:** figyelni kell a fertőzések kialakulásának jeleire. **Allergiás reakciók:** súlyos allergiás reakciók esetén a globulinom alkalmazását azonnal be kell fejezni, és megfelelő kezelést kell kezdeni. **Latex szenzitivitás:** az injekciós toll tűjének védőkupája latex tartalmú, az arra érzékenyeknél allergiás reakciót válthat ki. **Különböző betegcsoportok:** idősök (>65 év) kezelését körültekintően kell végezni, kiemelt figyelmet fordítva a fertőzések előfordulására. Vese- v. májkorosodásban szenvedő betegeknél nem végeztek specifikus vizsgálatokat. Májkorosodásban szenvedőknél óvatosan kell adni. Gyermekegygyázzati betegeknél javasolt, hogy a globulinom-kezelés megkezdése előtt a hatályos védőoltási irányelveknek megfelelően megkapjanak minden védőoltást. 18 évesnél fiatalabb betegek a pJIA-tól előre indikációkra vonatkozóan nem igazoltak biztonságosságot és hatékonyságot. **Interakciók:** globulinom és anakinra, abatacept v. egyéb biológiai terápia kombinált alkalmazása nem ajánlott. A globulinommal egyidejűleg nem adhatók elő vakcinák, ill. terápiás alkalmazásra fordító ágensek alkalmazása nem javasolt. Egyidejű MTX-kezelés: az adatok nem utalnak arra, hogy akár a globulinom, akár a MTX adagjának megváltoztatása lenne szükség. **Terhesség és szoptatás:** terhesség nőknél nem ajánlott. Fogamzóképes nőknek hatékony fogamzásgátlást kell alkalmazniuk, és az előírtatni kell az utolsó adagolt számtól min. 6 hónapig. A kezelés alatt és az utolsó adagolt számtól min. 6 hónapig nem szabad szoptatni. **Főbb mellékhatások (1%):** felső légúti infekciók (nasopharyngitis, pharyngitis, laryngitis, rhinitis), bakteriális fertőzés (cellulitis), alsó légúti fertőzés (pneumonia), vírusfertőzés (influenza, herpesz), bronchitis, sinusitis, felületes gombafertőzések, abszcessus, leukopenia, neutropenia, anaemia, allergiás reakciók (bronchospasmus, hyperszenzitivizációs, urticaria), autoantitest-pozitívitás, fejfájás, szédülés, hátfájás, hasfájás, fáradtság, szédülés, fejfájás, paresthesia, a kapszulától tünetek, csípő térd fájdalmak, biológiai hyperaktivitás, dyspareunia, gastrointestinális problémák, adomális fájdalom, hátfájás, hasfájás, szédülés, fejfájás, paresthesia, gastrointestinális problémák, megemelkedett gastritis, colitis, székrekedés, ALT/AST-emelkedés, alopecia, dermatitis, láz, aszténia, az injekció beadási helyén jelentkező reakciók (erythema, urticaria, induratio, fájdalom, véráfutás, viszketés, irritáció, praesthesia), mellkasi diszcomfort, csontörsegek. A gyermekegygyázzati vizsgálatban (pJIA) a jelentett nemkívánatos események típusa és gyakorisága általában hasonló volt a felnőttek bevonásával végzett RA vizsgálatokhoz megfigyelveket. **Felírási előír, kérjük, olvassa el a teljes alkalmazási előírást, különös tekintettel a javallatokra (4.1), az adagolásra (4.2), az ellenjavallatokra (4.3) és a figyelmeztetésekre (4.4) [11/10/2021 EMA/H/C/992/N/103]**

havi 
Simponi[®]
golimumab

PARKOLÁS A HELYSZÍNE

A Kölcsey Központ alatt található mélygarázsban DKV díjszabás érvényes (400.- Ft/óra/szkg.).

Érkezéskor a jegykiadó készüléken nyomja meg a jegykiadó gombot, ekkor a készülék kiadja a parkolókártyát. A kártyát tartsa magánál, mert nélküle nem tudja kifizetni a parkolás díját és elhagyni a parkolóházat. Figyelem! Minden behajtás díjköteles.

Parkolási díjat a mélygarázsban elhelyezett díjfizető-automatánál tudja befizetni!

A parkolási díj kifizetése után 15 perc áll rendelkezésére a parkolóház elhagyására.

A kijárat sorompó előtt elhelyezett kártyaolvasó készülékbe helyezze be a parkolókártyáját, hogy a készülék ellenőrizze azt. A sorompó felnyílása és a zöld jelzőlámpa kigyulladás után elhagyhatja a parkolóházat.

PARKOLÁS DEBRECENBEN

Parkolójegy váltása a parkoló-automatáknál lehetséges.

További információk kérhetők a DKV Ügyfélszolgálatán (<http://dkv.hu>)
Díjfizetés a fizető automata vagy mobiltelefon segítségével is történhet.

VILLAMOS

Debrecen 1-es és 2-es villamosa a legtöbb szálloda és a kongresszus helyszíne között jó közlekedési alternatíva. (A Kölcsey Központhoz a Debrecen Plaza megállónál kell leszállniuk.)

JAVASOLT TAXI TÁRSASÁG

Főnix Taxi, 24 órás taxi szolgálat, telefon: 52/444-444, 20/3-444-444, 30/9-444-444, 70/2-444-555

PÉNZÜGYEK, SZÁMLÁZÁS

A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállításra kerülő számlán az érvényes jogszabályok szerint tüntettük fel. Számlamódosítás, új számla kiállítása a kongresszus végéig, legkésőbb 2022. május 19-ig lehetséges. Ezen időpont után nem áll módunkban a megrendelésén és az erről kiállított számlán változtatni.

LEMONDÁSI, MÓDOSÍTÁSI FELTÉTELEK

A szállás díját **2022. február 13-ig**, a részvételi díjat és az ebédek díját **2022. március 18-ig** történt lemondás esetén fizettük vissza.

Számlamódosítási díj: 4.000 Ft + Áfa.

A rendezvényt követően kizárólag a számla formai módosítása lehetséges.

A kiszámlázott és írásban le nem mondott szolgáltatások díját a megrendelő köteles megtéríteni, még akkor is, ha azokat nem vette igénybe!

KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK

Szervezőirodánk a hotel, szálláshely szolgáltatásokat és az étkezéseket, vendéglátó szolgáltatásokat változatlan formában közvetíti megrendelői felé. A lemondási- és kötbér feltételeket a szolgáltatók feltételeihez igazítva alakítjuk ki.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az értesítőben feltüntetett információk mellett a honlapon megtalálható Adatkezelési tájékoztatóban és Általános szerződési feltételekben foglaltak az irányadók.

FELELŐSSÉG- ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÁS

A kongresszus közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmazznak baleset-, betegség-, poggyász- és felelősségbiztosítási díjat. Így baleset, betegség és valamely káresemény bekövetkezése esetén a szervezőknek nem áll módjukban semmilyen felelősséget vagy kártérítést vállalni.

ELŐZZE MEG AZ OSZTEOPORÓZIS OKOZTA CSONTTÖRÉST

Közvetlenül hat az oszteoblasztokra.
Ezzel segíti a csontképződést és számos
betegcsoportban csökkenti a csonttörés
kockázatát.¹

▼ MOVYMIA: BIOHASONLÓ TERIPARATID TERÁPIA A STADA-TÓL

HATÁSOS: A teriparatid az endogén humán parathormon aktív aminosav fragmentuma, közvetlenül hat az oszteoblasztokra^{1,3} **EGYENÉRTÉKŰ:** A Movymia a hatásosság és biztonságosság szempontjából egyenértékű a referencia készítménnyel^{1,2,4,5,6*} **MEGFIZETHETŐ:** Kedvező ár⁶
KÖRNYEZETBARÁT: Egyetlen újrátölthető pen a teljes kezelési időszakra¹

STADA - több mint 125 éves tapasztalat a gyógyszergyártás és forgalmazás terén



1. Movymia® alkalmazási előírás. 2. Movymia® EPAR – public assessment report, letölthető itt: https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/movymia-epar-public-assessment-report_en.pdf Dátuma: 2017 március 16. 3. Brixen KT et al. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2004; 94(6):260-70. 4. Lyman GH et al. N Engl J Med. 2018; 378(21):2036-2044. 5. Janjigian YY et al. Future Oncol. 2018; 14(23):2403-2414. 6. Publikus gyógyszerforgalmazás 2021. 08. 01. http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalok/gyogyszer_segedeskoz_gyogyfurd_o_tamogatas/egeszsegugyi_vallalkozasoknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html

* Forsteo® A Movymia® térítési díja az árcsökkentés és a piaci viszonyok függvényében változhat.

* Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.

Movymia 20 µg/80 µl oldatos injekció

ATC KÓD: H05AA02

HATÓANYAG: Teriparatid

A gyógyszer rendelése előtt a figyelmeztetések, alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések, gyógyszerköölcsönhatások és egyéb interakciók tekintetében olvassa el a teljes alkalmazási előírást!
A QR kódot okostelefonnal lefényképezve az adott gyógyszer alkalmazási előírása nyílik meg. **Szöveg ellenőrzésének dátuma:** 2021.11.03.

Készítmény megnevezése	Bruttó fogyasztói ár (Ft)	Emelt támogatási összeg (Ft)	Térítési díj emelt támogatás esetén (Ft)	Indikációs pont EU 90
MOVYMIA 20 MIKROGRAMM/80 MIKROLITER OLDATOS INJEKCIÓ 1x2,4ml patronban	58 130	52 317	5 813	29
MOVYMIA 20 MIKROGRAMM/80 MIKROLITER OLDATOS INJEKCIÓ 1x2,4ml patronban + injekciós toll	58 130	52 317	5 813	29

Oszteoporotikus törések szekunder prevenciójára választható postmenopausában lévő nő vagy 55 év feletti férfi betegnél, bizonyos feltételek teljesülése esetén. A finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszeri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján. A beteg legfeljebb 18 havi kezelést, legfeljebb 24 hónap alatt vehet igénybe. A kezelés nem ismételt.

A feltüntetett, 2021. december 1.-től érvényes árra vonatkozó adatokat a 2021. december 1.-én a www.neak.gov.hu oldalon hozzáférhető adatok alapján közöltük. Az adatok visszavonásig érvényesek. A bruttó fogyasztói ár megegyezik a közfinanszírozás alapjául elfogadott árral. A jelen anyag kizárólag szakorvosoknak készült. A jelen tájékoztató anyag tartalmazza a Movymia 20 µg/80 µl oldatos injekció közfinanszírozás alapjául elfogadott árát, a támogatás összegét, valamint térítési díját emelt társadalombiztosítási támogatással történő rendelés esetén. **A STADA HUNGARY Kft. nem vállal felelősséget a közölt információk illetéktelen felhasználásából eredő következményekért!** A gyógyszer rendelése előtt a figyelmeztetések, alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések, gyógyszerköölcsönhatások és egyéb interakciók tekintetében olvassa el a teljes alkalmazási előírást! **OSZTÁLYOZÁS:** Osztályozás: II./2. csoport. Korlátozott érvényű orvosi rendelvényhez kötött, szakorvosi/kórházi diagnózist követően folyamatos szakorvosi ellenőrzés mellett alkalmazható gyógyszer (Sz). **A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA:** EU/1/16/1161/001 [1. patron], EU/1/16/1161/003 [patron és injekciós toll] **A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁ:** STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel, Németország info@stada.de. A gyógyszer alkalmazása során tapasztalt mellékhatásokat, kérjük, jelentsen a +36 30 643 6850-es telefonszámon vagy a pharmacovigilance@stada.hu e-mail címen. A dokumentum lezárásának dátuma: 2021. december 7.



[illegible]

Lassítsa az ILDe progresszióját!



1 gyógyszer, három indikáció¹
4 nagy vizsgálat - 1990 ofev-vel kezelt beteg¹

IPF

SSc-ILD

PF-ILD

- Az ILDe/ IPF korai felismerése kulcsfontosságú, mert a kórkép nem gyógyítható, de a progresszió lassítható^{1,2}
- SSc-ILD az egyik leggyakoribb szervi manifesztáció szisztémás szklerózisban, és az egyik vezető halálok ezeknél a betegeknél³
- PF-ILD - egy felmérés alapján⁴ az ILDe-s betegek 18-32% -ánál áll fenn a progresszív fibrotizáló fenotípus kialakulásának kockázata⁴

Az alkalmazási előírás a QR kódon keresztül érhető el.



A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Boehringer Ingelheim International GmbH. A forgalomba hozatali engedély számai: EU/1/14/979/001-004. Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (SZ). TB támogatás mértéke az IPF esetében Eü 100%. SSc-ILD és PF-ILD indikációk jelenleg nem támogatottak.

Eü 100 BNO J84 – az arra kijelölt centrumokban. Magyar Közlöny 2017. évi 78. szám 7986 oldal 11-es pont.

<http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17078.pdf>

A termékek árával kapcsolatban a változásokat a http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszsegugyi_vallalkozasoknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html honlapon tudja követni.

Használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a részletes alkalmazási előírást!

Irodalmak:

1) OFEV alkalmazási előírás 2021.01.07. 2) Avouac et al. Ann Rheum Dis 2011;70:476-81. 3) Steen & Medsger. Ann Rheum Dis 2007;66:940-4. 4) Wijssenbeek MS, Kreuter M, Olson A, et al Curr Med Res Opin. 2019;35(11):2015-2024

Készítmény megnevezése	Közfinanszírozás alapjául elfogadott ár (Ft)	TB támogatás mértéke	Vonatkozó indikációs pont	Beteg által fizetendő ár (Ft)
OFEV 150mg 60x	708 417	Eü 100 (J84)	62	300
OFEV 100mg 60x	434 026	Eü 100 (J84)	62	300



**Boehringer
Ingelheim**

Orvosi információ: medinfo.hu@boehringer-ingelheim.com

Boehringer Ingelheim
RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe
1095 Budapest, Lechner O. fasor 10.
Tel.: 1 299-8900; Fax: 1 299-8901
www.boehringer-ingelheim.hu

PC-FIL-102228
1. kiadás dátuma:
2021.09.25



Milurit® 100 mg
200 mg
300 mg
allopurinol

50 éve szövetségesünk
a köszvény és a hyperurikaemia
kezelésében

Csökkenti mind a szérum,
mind a vizelet húgysavszintjét...¹

A napi terápiás dózis könnyen
beállítható a különböző
hatáserősségek alkalmazásával.

Magyarországon éves szinten több mint
500.000 beteg részesül Milurit® kezelésében.²

**Milurit® 100 mg, 200 mg, 300 mg tabletta
alkalmazási előírás:**



**Milurit® 100 mg
tabletta**

https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradattbazis&action=show_detail&item=15833



**Milurit® 200 mg
tabletta**

https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradattbazis&action=show_detail&item=161978



**Milurit® 300 mg
tabletta**

https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradattbazis&action=show_detail&item=15834

Árinformáció:

Milurit® 100 mg 50x: fogyasztói ár: 711 Ft, TB támogatás: 569 Ft, térítési díj: 142 Ft;
Milurit® 200 mg 30x: fogyasztói ár: 576 Ft, TB támogatás: 461 Ft, térítési díj: 115 Ft;
Milurit® 200 mg 60x: fogyasztói ár: 1 101 Ft, TB támogatás: 881 Ft, térítési díj: 220 Ft;
Milurit® 300 mg 30x: fogyasztói ár: 861 Ft, TB támogatás: 689 Ft, térítési díj: 172 Ft.

Termékeink árvaltozásával és rendelkezhetőségével kapcsolatos információkért forduljon orvosátogató kollégáinkhoz. Illetve ezekről tájékozódhat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján: www.neak.gov.hu. Amennyiben termékeink alkalmazása során „Nemkívánatos eseményt” észlel, kérjük, 24 órán belül jelentse a pharmacovigilance@egis.hu e-mail címen vagy a +36-1-803-22-22-es teleforszámon.

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

1. Milurit® 100 mg 50x tabletta alkalmazási előírás: Forgatombi hozatali engedély száma: OGYI-T-3431/01; Milurit® 200 mg 30x tabletta alkalmazási előírás: Forgatombi hozatali engedély száma: OGYI-T-3431/31; Milurit® 200 mg 60x tabletta alkalmazási előírás: Forgatombi hozatali engedély száma: OGYI-T-3431/36; Milurit® 300 mg 30x tabletta alkalmazási előírás: Forgatombi hozatali engedély száma: OGYI-T-3431/02.

2. http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_ajdolat/publikus_forgalmi_adatok/gyogyszer_forgalmi_adatok

MIL42

További információk:
Egis Gyógyszergyár Zrt. Kardiometabolikus üzletág,
1134 Budapest, Lehel u. 15.,
tel.: 06-1-803-2222,
e-mail: marketing@egis.hu, honlap: hu.egis.health
Lezárás dátuma: 2022. 04. 25.



- 1 Kölcsey Központ
- 2 Hotel Lycium
- 3 Hotel Divinus
- 4 Hotel Aquaticum
- 5 Centrum Hotel
- 6 Hotel Óbester
- 7 Hotel Nagyerdő
- 8 Platán Hotel
- 9 Malom Hotel
- 10 Vasútállomás
- 11 Autóbusz-pályaudvar



A SANDOZ AZ ÖN PARTNERE A REUMÁS MEGBETEGEDÉSEK KEZELÉSÉBEN



Elnevas[®] (Methotrexat) 1x0,5 ml, 1 x 0,75 ml, 1x 1ml, 1 x 1,25 ml előretöltött fecskendőben
 ▼ Erelzi[®] (Etanercept) 25 mg és 50 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben valamint Erelzi 50 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban
 ▼ Hyrimoz[®] (Adalimumab) 40 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben és injekciós tollban
 ▼ Zessly[®] (Infliximab) 100 mg per oldatos infúzióhoz való koncentrátumban

▼ Ezek a gyógyszerek felsorolt felületeit alól állnak, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors szórakozását. Az egészségügyi szakembereknek arra kell kérni, hogy jelentenek bármilyen felhívást mellékhatást az OGYÉI-nak az online Készenléti Szolgálaton, a Készenléti Szolgálaton (https://www.ogyei.gov.hu/dynatools/melhatas_bajjelentes2015_M02.pdf) az old-korlat@ogyei.gov.hu e-mail címen, a (+36) 1 886-9472 faxszámon vagy az OGYÉI, 1372 Budapest, Pf. 430. levelezési címen.

Bővebb információkat olvasson el a gyógyszerek alkalmazási előírásait

A hatályos alkalmazási előírások teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerbiztonsági Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszerbiztonsagi-intezet) vagy az Európai Gyógyszerbiztonsági Intézet (www.ema.europa.eu) honlapján. Elnézői (honlap: www.ogyei.gov.hu, Adatbázisok, nyelvtörténetek, Gyógyszer-adatbázis, Gyógyszerek neve, EBETREXAT[®] 20 mg/ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben/Erelzi[®] 50 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban / Hyrimoz[®] 40 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban/Zessly[®] 100 mg oldatos infúzió. Keresés indítása: **RE**

Termék neve	Hatóanyag mennyiség	Fogyasztási ár	Emelt 90% támogatás*	Tényleges díj*
Elnevas [®] 1x0,5 ml előretöltött fecskendőben	10 mg	2 315 Ft	2 084 Ft	231 Ft
Elnevas [®] 1x0,75 ml előretöltött fecskendőben	15 mg	2 994 Ft	2 495 Ft	499 Ft
Elnevas [®] 1x1 ml előretöltött fecskendőben	20 mg	3 683 Ft	3 315 Ft	368 Ft
Elnevas [®] 1x1,25 ml előretöltött fecskendőben	25 mg	4 572 Ft	4 115 Ft	457 Ft

2022. március 1-jétől érvényes árak alapján: www.nark.gov.hu
 * EU90 14/a.

A 9/1993 NM rendelet alapján az előbbi gyógyszerek teljes elnevezése az alábbiakban található, a felhasználásra vonatkozó intézkedések számát a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat Alapvető Könyvtárának keretében szerzi be.

Termék neve	Erdő fogyasztási ár
Erelzi [®] 25 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben	96 681 Ft
Erelzi [®] 50 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben	192 875 Ft
Erelzi [®] 50 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban	192 875 Ft
Hyrimoz [®] 40 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben	173 691 Ft
Hyrimoz [®] 40 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban	173 691 Ft
Zessly [®] 100 mg per oldatos infúzióhoz való koncentrátumban	97 120 Ft

Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.nark.gov.hu honlapon található információkat. Elnézői (honlap: <http://www.nark.gov.hu>, szakmai: gyogyszer@nark.gov.hu), egészségügyi szakembereknek, publikus gyógyszerárak, végleges: Publikus gyógyszerárak - lakosság (lakosság).

Közérthető egészségügyi szakemberekkel való kommunikáció.
 Kérjük, ne tegye a gyógyszerárak részére elérhető vagy láthatóvá.

A dokumentum legutóbbi módosítása: 2022. 03. 21. • 5502929/03.22

SANDOZ A Novartis
Division

Sandoz Hungaria Kft. • 1114 Budapest, Banták Béla út 43-47
 Tel.: 430-2890 • Fax: 430-2899 • web: www.sandoz.hu



AZ ELSŐ ÉS EGYETLEN JAK-GÁTLÓ 4 REUMATOLÓGIAI INDIKÁCIÓVAL



RHEUMATOID
ARTHRITIS (RA)



ARTHRITIS
PSORIATICA (PSA)



POLYARTICULARIS JUVENILIS
IDIOPATHIAS ARTHRITIS (JIA)



SPONDYLITIS
ANKYLOPNETICA (SPA)



XELJANZ[®]
[tofacitinib-citrát]
5 mg filmtabletta



▼ Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását.
Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.

Xeljanz[®] 5 mg filmtabletta

Hatóanyag: 5 mg tofacitinibnek megfelelő tofacitinib-citrátot tartalmaz filmtablettánként.

Terápiás javallatok: Rheumatoid arthritis. A tofacitinib metotrexáttal (MTX) kombinálva a közepesen súlyos vagy súlyos aktív rheumatoid arthritis (RA) kezelésére javallott olyan felnőtt betegeknek, akik nem megfelelően reagáltak, vagy akik intoleránsak egy vagy több betegségmódosító antireumatikus gyógyszerre. A tofacitinib monoterápiában is alkalmazható metotrexát-intolerancia esetén, vagy akkor, ha a metotrexát kezelés nem megfelelő. Spondylitis ankylopoetica: A tofacitinib olyan spondylitis ankylopoeticával (APS, Bechterew-kór) élő felnőtt betegek kezelésére javallott, akik nem reagáltak megfelelően a hagyományos kezelésre. Arthritis psoriatica: A tofacitinib metotrexáttal kombinálva az aktív arthritis psoriatica (PsA) kezelésére javallott olyan felnőtt betegeknek, akik nem megfelelően reagáltak, vagy akik intoleránsak egy betegségmódosító antireumatikus gyógyszerrel (DMARD-dal) végzett korábbi kezelésre. Colitis ulcerosa, tofacitinib közepesen súlyos vagy súlyos aktív colitis ulcerosa (CU) kezelésére javallott olyan felnőtt betegeknek, akik nem megfelelően reagáltak, akiknél nem megfelelően reagálnak, akiknél eltűnik a válság, vagy akik intoleránsak vagy a hagyományos terápiára, vagy egy biológiai gyógyszerre. Juvenilis idiopathias arthritis: A tofacitinib az aktív polyarticularis juvenilis idiopathias arthritis (rheumatoid faktor pozitív [RF+] vagy negatív [RF-] polyarthritis és kiterjedt oligoarthritis) és juvenilis arthritis psoriatica (PsA) kezelésére javallott olyan 2 éves és idősebb betegeknek, akik nem megfelelően reagáltak a korábbi, betegségmódosító reumaellenes szerekkel (disease-modifying antirheumatic drug, DMARD) történő kezelésre. A tofacitinib adható metotrexáttal (MTX) kombinációban vagy monoterápiaként, MTX-intolerancia esetén, illetve amikor a folyamatos MTX-kezelés nem megfelelő.

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! Alkalmazási előírás: https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/xeljanz-epvcar-product-information_hu.pdf

A közfinanszírozás alapjaul elfogadott ár: 198 213 Ft

Az aktuális közfinanszírozás alapjaul elfogadott árt kérjük, keresse fel a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapját: http://neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeskoz_gyogyuldo_ramogatasa/egeszsegugyi_vallalkozasoknak/pupha/Veleges_PUPHA.html

Kiadhatóság: Szakorvosi/kórközi diagnózist követően folyamatosan szakorvosi ellenőrzés mellett adható gyógyszerkészítmény (SZ). A támogatás mértéke: Tételre elszámolás alá eső készítmény. A tételre elszámolás alá eső indikációkat és az elszámolásra jogosult intézményeket lásd a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú mellékletében. A tételre elszámolás alá eső indikációkban a beteg által fizetendő terítési díj 0 Ft. Az aktuálisan érvényes árt kérjük, keresse fel a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapját (www.neak.gov.hu).

Amennyiben nem kívánatos eseményt szeretne jelenteni, Kérjük, lépjen kapcsolatba cégünkkel a következő elérhetőségeken: +36-30-383-8906 vagy HUN.AEreporting@pfizer.com. Az Ön személyes adatainak védelme fontos számunkra. Személyes adatai kezelésére vonatkozó bővebb információért kérjük, tekintse meg az Adatvédelmi Tájékoztatót, amely az Ön személyes adatai kezelése kapcsán megjelölt jogokról is tájékoztatást nyújt. Amennyiben a továbbiakban nem kíván tőlünk hírlevelet kapni, kattintson az alábbi linkre: [Leiratkozás](#)

Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.

1123 Budapest, Alkotás u. 53. MOM Park „A” épület

Tel: +36 1/488-3700

www.pfizer.hu

Lezárás dátuma: 2022. 02. 01.

PP-XEL-HUN-0134



FŐSZERVEZŐ

Prof. Dr. Szekanecz Zoltán

DE ÁOK Reumatológiai Tanszék

4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.

Tel./Fax: 52/255-091

E-mail: szekanecz.zoltan@med.unideb.hu

A SZERVEZŐ IRODA CÍME

CONGRESS & HOBBY SERVICE KFT.

Kongresszus- és Rendezvényszervező Iroda

6701 Szeged, Pf.: 1022.

Telefon: 62/484-531, 484-532

Fax: 62/450-014

E-mail: info@congress-service.hu

Web: <https://congress-service.hu>

A RENDEZVÉNY HONLAPJA

<https://congress-service.hu/rendezveny/drop2022>